

অধ্যায়-৮ঃ ত্রিকোণমিতি

Type-1: সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. যদি $\sin\left(\theta - \frac{5\pi}{2}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ হয়, তাহলে $\tan 2\theta$ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২৬]
২. $\operatorname{cosec}\left(A - \frac{11\pi}{2}\right)$ কে $\sin A$ এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। [ব.বো-২৬]
৩. $\sin B = \sqrt{2} - \cos B$ হলে, প্রমাণ কর যে, $B = \frac{\pi}{4}$ । [কু.বো-২৬]
৪. সমাধান কর : $2\cos^2\theta = 1 + 2\sin^2\theta$ যখন $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ । [দি.বো-২৬]
৫. প্রমাণ কর যে, $\cos \frac{17\pi}{4} + \cos \frac{21\pi}{4} + \sin \frac{41\pi}{5} - \sin \frac{\pi}{5} = 0$ । [য.বো-২৬]
৬. যদি $\sin\theta = \frac{x}{y}$ হয় তবে, $\cot\theta$ এর মান নির্ণয় কর; যখন $x > y > 0$ । [রা.বো-২৬]
৭. সমাধান কর: $\frac{1}{\operatorname{cosec}\beta} + \frac{1}{\sec\beta} = \sqrt{2}$, যেখানে $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$ । [সি.বো-২৬]
৮. যদি $\theta = \frac{3\pi}{4}$ হয়, তাহলে $\tan\theta + \sec\theta$ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২৬]
৯. $\operatorname{cosec}\theta = -2$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। [ব.বো-২৬]
১০. $\sin^2 \frac{3\pi}{4} + \sin^2 \frac{5\pi}{4}$ এর মান নির্ণয় কর। [কু.বো-২৬]
১১. $\cos\left(-\frac{13\pi}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। [চ.বো-২৬]
১২. মান নির্ণয় কর: $\cot\left(\theta - \frac{17\pi}{2}\right)$ । [য.বো-২৬]
১৩. $\theta = \frac{-35\pi}{6}$ হলে, P এর মান নির্ণয় কর। [ম.বো-২৬]
১৪. $p = \frac{5\pi}{6}$ এবং $q = \frac{\pi}{3}$ হলে, $\frac{\cot p + \cot q}{1 + \cot p \cdot \cot q}$ এর মান নির্ণয় কর। [রা.বো-২৬]
১৫. $\theta = \frac{\pi}{6}$ হলে, দেখাও যে, $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$ । [সি.বো-২৬]
১৬. $\operatorname{cosec}\left(\frac{-25\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২৫]
১৭. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 5 : 4 হলে, ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণটিকে স্টাটমূলক পদ্ধতিতে প্রকাশ কর। [রা.বো-২৫]
১৮. $30^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [য.বো-২৫]
১৯. $\tan\left(-\frac{25\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। [কু.বো-২৫]
২০. $85^\circ 15'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [চ.বো-২৫]
২১. একটি চাকা 2.25 কিলোমিটার পথ যেতে 45 বার ঘুরে। চাকাটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর। [সি.বো-২৫]
২২. $15^\circ 30' 18''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [ব.বো-২৫]
২৩. $50^\circ 40' 30''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [দি.বো-২৫]
২৪. 4 : 35 টার ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [ম.বো-২৫]
২৫. $\sec\left(\frac{-31\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। [দি.বো-২৬]
১৮. $20^\circ 24' 35''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [ব.বো-২৪]
১৯. $40^\circ 21' 20''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [সি.বো-২৩]
২০. $20^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [ঢা.বো-২৪]
২১. $15' 7''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [সি.বো-২৪]
২২. $33^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [কু.বো-২২]
২৩. $35^\circ 29' 37''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। [সি.বো-২২]

২৪. $75^{\circ}25'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[ঢা.বো-২১]
২৫. $40^{\circ}55'54''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[রা.বো-২১]
২৬. $40^{\circ}21'10''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[কু.বো-২১]
২৭. $45^{\circ}30'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[কু.বো-২১]
২৮. $18^{\circ}33'45''$ কে বৃত্তীয় এককে প্রকাশ কর।	[ব.বো-২১]
২৯. $40^{\circ}35'20''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[সি.বো-২১]
৩০. $30^{\circ}15'36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[ঢা.বো-২০]
৩১. $36^{\circ}9'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।	[সি.বো-২০]
৩২. 1.532 রেডিয়ানকে ডিগ্রিতে প্রকাশ কর।	[য.বো-২৩]
৩৩. $\frac{5\pi}{13}$ কে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে প্রকাশ কর।	[য.বো-২২]
৩৪. $\frac{2\pi}{9}$ রেডিয়ানকে ডিগ্রিতে প্রকাশ কর।	[চ.বো-২১]
৩৫. 0.5273 রেডিয়ানকে ডিগ্রি এককে রূপান্তর কর।	[দি.বো-২১]
৩৬. 0.25 মিটার ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি চাকার পরিধি নির্ণয় কর।	[দি.বো-২২]
৩৭. $\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{7}}$ হলে, $\cot \beta$ এর মান নির্ণয় কর।	[দি.বো-২৩]
৩৮. $\tan \theta = \frac{3}{4}$ হলে $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান বের কর।	[রা.বো-২০]
৩৯. $B = \frac{\pi}{3}$ হলে, দেখাও যে, $\sin 2B = 2 \sin B \cos B$.	[চ.বো-২১]
৪০. $\sin A + \sin^2 A = 1$ হলে দেখাও যে, $\cos^2 A + \cos^4 A = 1$.	[ম.বো-২৩]
৪১. $\cos \theta + \sin \theta = 1$ হলে দেখাও যে, $\sin \theta - \cos \theta = \pm 1$.	[রা.বো-২১]
৪২. $\sin \theta - \cos \theta = \frac{7}{13}$ হলে, $(\sin \theta + \cos \theta)$ এর মান নির্ণয় কর।	[সি.বো-২১]
৪৩. দেখাও যে, $\operatorname{cosec}^4 \theta - \operatorname{cosec}^2 \theta = \cot^4 \theta + \cot^2 \theta$.	[ব.বো-২৩]
৪৪. $\cos \left(-\frac{25\pi}{3} \right)$ এর মান নির্ণয় কর।	[রা.বো-২৩]
৪৫. $\tan \left(-\frac{25\pi}{6} \right)$ এর মান নির্ণয় কর।	[কু.বো-২৩]
৪৬. $\tan \left(\frac{7\pi}{6} \right)$ এর মান নির্ণয় কর।	[ঢা.বো-২২]
৪৭. $\sin (-750^{\circ})$ এর মান নির্ণয় কর।	[রা.বো-২২]
৪৮. $\cos \left(-\frac{35\pi}{6} \right)$ এর মান নির্ণয় কর।	[দি.বো-২১]
৪৯. -315° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত চিত্রসহ নির্ণয় কর।	[ম.বো-২৪]
৫০. -620° এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে চিত্রসহ নির্ণয় কর।	[য.বো-২১]
৫১. চিত্রসহ -510° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে নির্ণয় কর।	[কু.বো-২১]
৫২. -1465° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত তা চিত্রসহ নির্ণয় কর।	[সি.বো-২১]
৫৩. চিত্রসহ -840° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে নির্ণয় কর।	[য.বো-২০]
৫৪. $\tan \theta = -\sqrt{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0 < \theta < \pi$.	[দি.বো-২২]
৫৫. $\tan^2 \frac{7\pi}{6} - \cos^2 \frac{5\pi}{4}$ এর মান নির্ণয় কর।	[ম.বো-২১]

৫৬. $\sin^2 15^\circ + \sin^2 75^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।

[ঢা.বো-২৩]

৫৭. $N = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$ এবং $\theta = \frac{\pi}{3}$ হলে, দেখাও যে, $N = \sqrt{3}$.

[চ.বো-২২]

৫৮. প্রমাণ কর যে, $\cos \frac{17\pi}{10} + \cos \frac{13\pi}{10} + \cos \frac{9\pi}{10} + \cos \frac{\pi}{10} = 0$.

[ম.বো-২০]

৫৯. $\cot \theta = 1$ হলে $\sin^2 \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

[ঢা.বো-২১]

৬০. $a = \cot \theta$, $b = \operatorname{cosec} \theta$ এবং $4\theta = \pi$ হলে, $a + b^2$ এর মান নির্ণয় কর।

[রা.বো-২৪]

৬১. $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর।


[চ.বো-২০]

৬২. যদি $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর।

[ব.বো-২০]

Type-2: অনুশীলনী-৮.১ (১০, ১১, উদা-৪, প্রতিজ্ঞা-৪, প্রমাণ $s = r\theta$)

১. ঢাকা ও রাজশাহী পৃথিবীর কেন্দ্রে $3^\circ 2' 3''$ কোণ উৎপন্ন করে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি.মি. হলে, ঢাকা ও রাজশাহীর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। [চ.বো-২৪]
২. একটি পাহাড়ের উচ্চতা 8.848 কিলোমিটার। পাহাড়টির শীর্ষবিন্দু দূরবর্তী কোনো একটি স্থানে 2.25° কোণ উৎপন্ন করে। পাহাড় থেকে ঐ স্থানটির দূরত্ব নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২২]
৩. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি.মি.। পৃথিবী পৃষ্ঠের দুইটি স্থান কেন্দ্রে $30''$ কোণ উৎপন্ন করে। পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থান দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। [রা.বো-২২]
৪. পৃথিবীর উপরের দুইটি স্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে $5^\circ 6' 36''$ কোণ উৎপন্ন করে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি. মি. হলে স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। [দি.বো-২১]
৫. 10 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের যে চাপ কেন্দ্রে 32° কোণ উৎপন্ন করে, তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [চ.বো-২৩]
৬. 10.5 km দূরে একটি বিন্দুতে কোনো পাহাড় 20° কোণ উৎপন্ন করে। পাহাড়টির উচ্চতা নির্ণয় কর। [ব.বো-২২]
৭. 10 সে.মি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের যে চাপ কেন্দ্রে 30° কোণ উৎপন্ন করে, তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [দি.বো-২০]
৮. একটি ঢাকা 2.88 কিলোমিটার পথ যেতে 120 বার ঘুরে। ঢাকাটির ব্যাসার্ধ কত? [ব.বো-২১]



৯. $\theta = 60^\circ$ এবং $r = 50$ কি.মি. হলে 5 কি.মি/ঘণ্টা বেগে A থেকে B তে যেতে কত সময় লাগবে তা নির্ণয় কর।


[ম.বো-২০]

১০. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 5 : 7 হলে, বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয়মান নির্ণয় কর। [দি.বো-২৪]


১১. কোনো ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 2 : 5 : 8 হলে, বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয়মান নির্ণয় কর। [ম.বো-২২]

১২. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 5 : 2 : 7। বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয় মান নির্ণয় কর। [ম.বো-২১]

১৩. ΔABC -এ, $A + B + C = \pi$ এবং $A : B : C = 1 : 2 : 3$ হলে $\tan^2 B + 2 \cos B$ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২১]



১৪. 'O' অর্ধবৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাস, PQ = 6 সে.মি. চিত্র হতে PR চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং দেখাও $\angle QOR$ প্রবক। [ব.বো-২১]



১৫. চিত্রে, $AB = OB$ হলে জ্যামিতিক উপায়ে প্রমাণ কর যে, θ একটি প্রব কোণ। [য.বো-২১]

[য.বো-২১]

১৬. সকাল ৪ : ৩০ টায় ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণকে ডিগ্রিতে নির্ণয় কর।

[য.বো-২৪]

১৭. রতন সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ঐ স্থান থেকে পাহাড়টি দেখার চেষ্টা করছিল। উক্ত সময়ে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণের মানকে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

[ঢা.বো-২২]

Type-3: [অনু-৮.২ {৬(চ), ৭, ৮}]

১. $P = 1 - \sin \theta$ এবং $Q = 1 - \cos \theta$ হলো দুটি ত্রিকোণমিতিক রাশি। প্রমাণ কর যে, $\frac{1 - (P - Q)}{1 - (P + Q)} = \frac{1 - Q}{P}$ । [ঢা.বো-২৬]

২. $A = \sin \theta - \cos \theta + 1$, $B = \sin \theta + \cos \theta - 1$ এবং $C = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{A}{B} = C$ । [ঢা.বো-২৫]

৩. $A = \sin \theta$, $B = \cos \theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{A+B+1}{A+B-1} = \frac{B}{1-A}$ । [রা.বো-২৫]

৪. $P = \sin \theta$ এবং $Q = \cos \theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{Q-P+1}{Q+P-1} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$ । [কু.বো-২৫]

৫. $m = \tan \theta$, $n = \sec \theta$ এবং $q = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{m+n-1}{m-n+1} = q$ । [চ.বো-২৫]

৬. $M = \sin \theta$, $N = \tan \theta$ এবং $R = \sec \theta$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{1-N-R}{R-N-1} = \sqrt{\frac{1+M}{1-M}}$ । [ব.বো-২৫]

৭. $A = \frac{\cos \theta - \sin \theta + 1}{\cos \theta + \sin \theta - 1}$ এবং $B = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$, হলে, দেখাও যে, $A = B$ । [ম.বো-২৫]

৮. $A = \sec \theta + \tan \theta$ এবং $B = \sec \theta - \tan \theta$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{A-1}{1-B} = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ । [কু.বো-২৩]

৯. $a = \cot \theta$ এবং $b = \operatorname{cosec} \theta - 1$ হলে দেখাও যে, $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$ । [ঢা.বো-২১]

১০. $\cos \theta + \sin \theta = x$ এবং $\cos \theta - \sin \theta = y$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{y+1}{x-1} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$ । [রা.বো-২১]

১১. $P = \sin \theta$ এবং $Q = \cos \theta$ হলে দেখাও যে, $\frac{P-Q+1}{P+Q-1} = \frac{1+P}{Q}$ । [কু.বো-২১]

১২. $a = \sec \theta - \tan \theta$, যেখানে হলে প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = \frac{1-a}{1+a}$ । [চ.বো-২৩]

১৩. $P = \frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1}$ হলে প্রমাণ কর যে, $P = \sqrt{\frac{\sec A + 1}{\sec A - 1}}$ । [ম.বো-২৪]

১৪. $P = \cot \theta$, $Q = \operatorname{cosec} \theta$ এবং $R = \cos \theta$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{1-P-Q}{Q-P-1} = \sqrt{\frac{1+R}{1-R}}$ । [কু.বো-২১]


১৫. $\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta = 2$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \tan \theta + \sec \theta$ । [সি.বো-২৩]

১৬. $A = \frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1}$ এবং $B = \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}$ হলে প্রমাণ কর যে, $A^2 - B^2 = 0$ । [ম.বো-২১]


১৭. $f(x) = \cos x$ এবং $f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + f(\theta) = \sqrt{2}f(\theta)$ হলে প্রমাণ কর যে, $f(\theta) - f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ । [রা.বো-২০]

১৮. $y \sin A - x \cos A = 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $(\sin A - \cos A)^2 = \frac{(x-y)^2}{x^2 + y^2}$ । [সি.বো-২১]

Type-4: [অনুশীলনী-৮.২ এর ১০ নং]




১. চিত্র হতে, $\frac{AD}{OA} + \frac{OD}{OA} = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ [কু.বো-২৬]
২. $a = \operatorname{cosec} \theta$, $b = \cot \theta$ এবং $a + b = p$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sec \theta = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$ [দি.বো-২৪]
৩. $a = \cot \theta$ এবং $b = \operatorname{cosec} \theta$ এবং $a + b = x$ হলে, দেখাও যে, $\sec \theta = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ [রা.বো-২৪]
৪. $\sec \theta - \tan \theta = P$ এবং $P = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1 + x^2}{1 - x^2}$ [সি.বো-২৪]
৫. $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = x$ হলে দেখাও যে, $\cos \theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ [ব.বো-২২]
৬. $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = a$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{y + 1}{x - 1} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$ [রা.বো-২১]
৭. $P = \cot \theta$, $Q = \operatorname{cosec} \theta$ এবং $P - Q = m$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{1 - m^2}{1 + m^2}$ [চ.বো-২১]
৮. $\cot A + \operatorname{cosec} A = m$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos A = \frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}$ [দি.বো-২১]
৯. $A = \sec \alpha + \tan \alpha$ হলে দেখাও যে, $(A^2 - 1) \operatorname{cosec} \alpha = A^2 + 1$ [য.বো-২০]
১০. $\tan \theta + \sec \theta = x$ হলে প্রমাণ কর যে, $\sec \theta = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x} \right)$ [চ.বো-২০]
১১. $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = p$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sec \theta = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$ [সি.বো-২০]



১২. $\frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = a$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{2a}{a^2 + 1}$ [ব.বো-২৪]
১৩. $B = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sin \theta = \frac{2x}{x^2 + 1}$ [রা.বো-২২]
১৪. $P = \operatorname{cosec} x + \cot x$ হলে প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} x = \frac{1 + p^2}{2p}$ [ব.বো-২০]
১৫. $\sin \alpha + \cos \alpha = p$ এবং $\sec \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = q$ হলে প্রমাণ কর যে, $q(p^2 - 1) = 2p$ [চা.বো-২৩]
১৬. $F(\alpha) = \cos \alpha$ এবং $F\left(\frac{5\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{y^2 - 1}{y^2 + 1}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y^2 - A^2 = 0$. [দি.বো-২৩]

Type-5: [অনুশীলনী-৮.২ (১১ ও উদা-১৪)]




১. যদি $\angle R = \theta$, $A = \frac{QR}{PR}$, $B = \frac{PQ}{PR}$ এবং $mA - nB = \sqrt{m^2 + n^2 - r^2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $m \sin \theta + n \cos \theta = r$ । [রা.বো-২৬]
২. $l \sin \theta + m \cos \theta = n$ হলে, দেখাও যে, $l \cos \theta - m \sin \theta = \pm \sqrt{l^2 + m^2 - n^2}$ । [সি.বো-২৫]
৩. $A = x \cos \theta$, $B = y \sin \theta$ এবং $A + B = z$ হলে, প্রমাণ কর যে, $x \sin \theta - y \cos \theta = \pm \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}$ [য.বো-২৪]
৪. $p \sin^2 \theta + q \cos^2 \theta = 8$ হলে, $p = 11$ এবং $q = 7$ হলে, দেখাও যে, $\tan \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ । [য.বো-২৫]
৫. $\operatorname{cosec} \alpha + \cot \alpha = M$, যদি $M = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\sec \alpha = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$ । [দি.বো-২৫]
৬. $x \sin \theta + y \cos \theta = z$ হলে প্রমাণ কর যে, $x \cos \theta - y \sin \theta = \pm \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}$ । [রা.বো-২১]
৭. $M = \cos \theta$ এবং $N = \sin \theta$ হলে $aN - bM = c$ হলে, দেখাও যে, $aM + bN = \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$ [চ.বো-২১]
৮. $A = \cos \theta$, $B = \sin \theta$ এবং $XA - YB = Z$ হলে প্রমাণ কর যে, $XB + YA = \pm \sqrt{X^2 + Y^2 - Z^2}$ [দি.বো-২১]
৯. $p \sin \theta + q \cos \theta = r$ হলে প্রমাণ কর যে, $p \cos \theta - q \sin \theta = \pm \sqrt{p^2 + q^2 - r^2}$ [কু.বো-২০]
১০. $A = x \cos \theta$, $B = y \sin \theta$ এবং $A + B = z$ হলে প্রমাণ কর যে, $x \sin \theta - y \cos \theta = \pm \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}$ [ব.বো-১৭]
১১. যদি $f(x) = \sin x$ এবং $af(\theta) + bf\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = c$ হয় তাহলে প্রমাণ কর যে, $af\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - bf(\theta) = \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$ [সি.বো-১৭]
১২. $P = a \cos \theta$, $Q = b \sin \theta$ এবং $P - Q = c$ হলে, প্রমাণ কর যে, $a \sin \theta + b \cos \theta = \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}$ [য.বো-১৬]
১৩. $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$ এবং $x - y = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ হলে প্রমাণ কর যে, $a \sin \theta + b \cos \theta - c = 0$ [রা.বো-১৯]
১৪. $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 4$ হলে, দেখাও যে, $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ [য.বো-২৩]
১৫. $P = a \cos \theta$, $Q = b \sin \theta$ এবং $a^2 = 3$, $b^2 = 7$ এবং $Q^2 + P^2 = 4$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\tan \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ [য.বো-১৬]
১৬. $P = \sin \theta$, $Q = \cos \theta$, $R = \tan \theta$ এবং $8P^2 + 5Q^2 = 7$ হলে, প্রমাণ কর যে, $R = \pm \sqrt{2}$ । [য.বো-২২]
১৭. $p \sin^2 \theta + q \cos^2 \theta = 8$, $p = 11$ এবং $q = 7$ হলে দেখাও যে, $\cot \theta = \pm \sqrt{3}$ [দি.বো-২২]
১৮. $7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta = 4$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cot \theta = \pm \sqrt{3}$ [য.বো-১৭]


Type-6: অনুশীলনী-৮.৩ {৮(চ), উদা-২৫}

১. $Q = \sin \theta$ এবং $P = \cos \theta$, $Q = -\frac{5}{13}$ এবং $\frac{P}{Q}$ ধনাত্মক হলে $\frac{\sin(-\theta) + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan(-\theta)}$ এর মান নির্ণয় কর। [ম.বো-২৬]
২. $P = \sin \theta$ এবং $Q = \cos \theta$ হলে, $12P = 5Q$ এবং $Q < 0$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos(-\theta) + \sin(-\theta)}{\cot \theta - \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{35}{13}$ [সি.বো-২৬]
৩. $Q = \frac{-\sin(-\theta) + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan(-\theta)}$, $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে, দেখাও যে, $Q = \frac{34}{39}$ [ঢা.বো-২৪]

৪. $A = \sin \theta$ এবং $B = \cos \theta$, $\frac{A}{B} = \frac{3}{4}$ এবং $\sin \theta$ ঋণাত্মক হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sec \theta + \tan \theta} = \frac{14}{5}$ [কু.বো-২৪]
৫. $\sin \theta = \frac{5}{13}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে, দেখাও যে, $\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$ [ম.বো-২৩]
৬. $5 \cot \theta = 12$ এবং $\sin \theta$ ঋণাত্মক হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos \theta - \sin(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta} = \frac{51}{26}$ [ম.বো-২২]
৭. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$ [কু.বো-২১]
৮. $P = \frac{12}{5}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে, $\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta}$ এর মান নির্ণয় কর। [চ.বো-২১]
৯. $M = \frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)}$ এবং $\sin \theta = \frac{5}{13}$ হলে, M এর মান নির্ণয় কর। যখন $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ [ব.বো-২১]
১০. যদি $13 \sin \theta - 5 = 0$ হয় এবং $\sin \theta$ ধনাত্মক ও $\cos \theta$ ঋণাত্মক হয় তবে $\frac{\tan \theta - \sec(-\theta)}{\cot \theta - \operatorname{cosec}(-\theta)}$ এর মান নির্ণয় কর। [ব.বো-২০]




১১. সর্বত্র অনুপাতের মানকে ধনাত্মক বিবেচনায় নিয়ে উদ্দীপকের ভিত্তিতে $\frac{\sin(-\theta) + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta}$ এর মান নির্ণয় কর। [সি.বো-১৫]
১২. $\tan \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta} = \frac{14}{5}$ [দি.বো-১৫]
১৩. $\tan \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে, $(\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta)^2$ এর মান নির্ণয় কর। [দি.বো-১৫]



১৪. নিজস্ব চিত্র ব্যবহার করে এর A চিহ্নিত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতসমূহ নির্ণয় কর। [সি.বো-১৫]

Type-7: অনুশীলনী-৮.৩ (৯ ও ১০)

১. $M = \sin^2 \frac{\pi}{15} + \sin^2 \frac{13\pi}{30} + \sin^2 \frac{16\pi}{15} + \sin^2 \frac{47\pi}{30}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $M = 2$ [চ.বো-২৬]
২. $A = \frac{\pi}{9}, B = \frac{7\pi}{18}, C = \frac{10\pi}{9}$ এবং $D = \frac{11\pi}{18}$ হলে, দেখাও যে, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + \sin^2 D = 2$ [দি.বো-২৬]
৩. $C = \sin^2 \frac{\pi}{15} + \sin^2 \frac{13\pi}{30} + \sin^2 \frac{16\pi}{15} + \sin^2 \frac{47\pi}{30}$ প্রমাণ কর যে, $C = \sec \frac{\pi}{3}$ [সি.বো-২২]
৪. চিত্রে আলোকে দেখাও যে, $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 + \tan^2 \alpha}$ [চ.বো-১৬]



৫. $2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - D\right) = \sqrt{3}$ হলে প্রমাণ কর যে, $3 \sin D - 4 \sin^3 D - \sin 3D = 0$.


[সি.বো-২১]

৬. $\cot\left(\frac{3\pi}{2} - B\right) = \sqrt{3}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos 3B = 4\cos^3 B - 3\cos B$

[দি.বো-২০]

৭. চিত্রের আলোকে $a = 1$ এবং $b = 2$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos 3\beta = 4\cos^3 \beta - 3\cos \beta$

[কু.বো-১৬]



৮. $\cot \alpha \operatorname{cosec} \alpha = P = 2\sqrt{3}$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$

[ম.বো-২২]

Type-8: উদাহরণ-২৯(গ)

১. $P = 1 - \sin \theta$ এবং $Q = 1 - \cos \theta$ হলে দুটি ত্রিকোণমিতিক রাশি। যদি $\frac{1-P}{4Q+1} = \frac{1}{4} \operatorname{cosec} \theta$ হয় এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ তাহলে θ এর মান নির্ণয় কর।

[ঢা.বো-২৬]

২. $x = \sin \theta, y = \cos \theta$ হলে, $2(xy + \sqrt{3}) = \sqrt{3}y + 4x$ সমীকরণটি সমাধান কর। যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ ।

[চ.বো-২৬]

৩. $Q = \sin \theta$ এবং $P = \cos \theta$ হলে, $\frac{1+P}{Q} = (\sqrt{3})^{-1}$ এবং $0 < \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

[ম.বো-২৬]

৪. $A = \sin \theta, B = \cos \theta$ এবং $\frac{A}{B} + \frac{B}{A} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর, যখন $0 < \theta < 2\pi$.

[রা.বো-২৫]

৫. $P = \sin \theta, Q = \cos \theta$ এবং $2PQ = Q$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

[কু.বো-২৫]

৬. $c = \cot \theta$ হলে, সমাধান কর: $c + \frac{1}{c} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$

[সি.বো-২৫]

৭. $M = \sin \theta, R = \sec \theta$ এবং $M^2 R - \frac{1}{R} = 1$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$

[ব.বো-২৫]

৮. $B = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$ এবং $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$.


[ম.বো-২৫]

৯. $A = \sin \theta$ এবং $B = \cos \theta, 2AB = A$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

[কু.বো-২৪]

১০. $a = \sin \theta, b = \cos \theta$ এবং $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0 < \theta < 2\pi$.

[চ.বো-২৪]



১১. $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

[ব.বো-২৪]

১২. $R = \tan \alpha + \sec \alpha$ যদি $R = \sqrt{3}$ এবং $0 < \alpha < 2\pi$ হয়, তবে α এর মান নির্ণয় কর।

[ম.বো-২৪]

১৩. $\tan \alpha + \sec \alpha = \sqrt{3}$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর। যখন $0 \leq \alpha \leq 2\pi$

[দি.বো-২৩]

১৪. যদি $a \cos \theta - b \sin \theta = c$ এবং $a = b = c = 1$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে, $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

[ঢা.বো-২৩]

১৫. $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

[কু.বো-২৩]

১৬. $\sec \theta - \tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

[চ.বো-২৩]

১৭. $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ হলে, $\sec \alpha$ এর মান নির্ণয় কর।

[কু.বো-২৪]

১৮. $B = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$ এবং $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \theta \leq 2\pi$

[রা.বো-২২]

১৯. $A = \sec \theta + \tan \theta$ এবং $A = \sqrt{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0 \leq \theta \leq 2\pi$.


[কু.বো-২২]

২০. $N = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$, $N = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $0 < \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

[চ.বো-২২]

২১. $\tan \theta + \sec \theta = y = \sqrt{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যখন $0 < \theta < 2\pi$.

[ব.বো-২২]



২২. চিত্র হতে $m + \sqrt{n^2 - m^2} = \sqrt{2}n$ হলে α এর মান নির্ণয় কর।

[কু.বো-২১]

২৩. $B = \cot x + \tan x = 2$ হলে, x এর মান নির্ণয় কর; যখন $0 < x < 2\pi$

[ব.বো-২২]

২৪. $p \sin \theta + q \cos \theta = a$, $p = q = \sqrt{3}$ এবং $a = \sqrt{6}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$.

[ম.বো-২১]

২৫. $\tan \theta + \sec \theta = \sqrt{3}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। [যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$

[চ.বো-২০]

২৬. $\sqrt{3} \sin x - \cos x = P$ এবং $0 \leq x \leq 2\pi$ হলে, x এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

[দি.বো-২০]

২৭. $\sec \theta - \tan \theta = (\sqrt{3})^{-1}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ।


[ঢা.বো-১৭]

২৮. $\tan \theta + \sec \theta = 1$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0^\circ \leq \theta < 90^\circ$

[রা.বো-১৭]


২৯. $A = \sec \theta + \tan \theta$ হলে θ এর সম্ভাব্য মানগুলো নির্ণয় কর যখন $A = \sqrt{3}$ এবং $0 < \theta < 2\pi$

[কু.বো-১৭]



৩০. চিত্রের আলোকে $\sqrt{x^2 + y^2} + x = \sqrt{3}y$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

[রা.বো-১৬]




৩১. চিত্রের আলোকে $a + \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{2}b$ হলে, β এর মান নির্ণয় কর।


[কু.বো-১৬]

Type-9: অনুশীলনী-৮.৩ (১২ ও ১৩)


১. $P = \sec\theta$ এবং $Q = \tan\theta$ হলে, সমাধান কর: $P^2 + Q^2 = 7$ যখন $0 < \theta < 2\pi$ । [দি.বো-২৬]
২. $P = \sec\theta$ এবং $Q = \tan\theta$ । $P^2 + 2Q^2 = 2$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [য.বো-২৬]
৩. $P = \sin\theta$ এবং $Q = \cos\theta$ হলে, $6P^2 + 2Q^2 = 3$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। [সি.বো-২৬]
৪. $R = \sin\theta$ এবং $S = \cos\theta$ হলে, $R^2 - S^2 = R$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। [ব.বো-২৬]
৫. $A = \sin\theta - \cos\theta + 1$ হলে, $A = 0$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২৫]
৬. $p \sin^2\theta + q \cos^2\theta = 8$ এবং $p = 9$, $q = 5$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর; যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ । [য.বো-২৫]
৭. $m = \tan\theta$, $n = \sec\theta$ এবং $m^2 + n^2 = \frac{5}{3}$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [চ.বো-২৫]
৮. $5 \sin^2\theta + 4 \cos^2\theta = P$; যদি $2P = 9$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ । [দি.বো-২৫]



৯. চিত্র হতে, $\left(\frac{AD}{OA}\right)^2 + \left(\frac{OD}{OA}\right)^2 = \frac{5}{3}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর যখন $0 < \theta < 2\pi$ । [কু.বো-২৬]



১০. $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ব্যবধিতে সমীকরণটির সমাধান কর: $\frac{2m^2}{m^2 + n^2} + \frac{3n}{\sqrt{m^2 + n^2}} - 3 = 0$ [য.বো-২৬]
১১. $R = \sin\theta$ এবং $S = \cos\theta$ হলে, $3R = \sqrt{3}S$ হলে, দেখাও যে, $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$ । [ব.বো-২৬]



১২. $x + \sqrt{(y+x)(y-x)} = \sqrt{2}y$ হলে, α কোণের মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ < \alpha < 2\pi$ । [রা.বো-২৬]
১৩. $a = \operatorname{cosec}\theta$ এবং $b = \cot\theta$, $3a^2 + 2b^2 = 18$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [দি.বো-২৪]
১৪. $3 \cot^2\theta + \operatorname{cosec}^2\theta = P$, $P = 5$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২৪]
১৫. $a = \cot\theta$, $b = \operatorname{cosec}\theta$, $3(a^2 + b^2) = 5$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। [রা.বো-২৪]
১৬. $A = x \cos\theta$, $B = y \sin\theta$, $x^2 = 3$, $y^2 = 7$ এবং $A^2 + B^2 = 4$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। (যখন $0 < \theta < 2\pi$) [য.বো-২৪]
১৭. $x = \sin\theta$, $y = \cos\theta$ এবং $2(y^2 - x^2) - 1 = 0$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যখন $0 < \theta < 2\pi$ । [ব.বো-২৩]
১৮. $M = \sin\theta$ এবং $N = \cos\theta$, $\frac{2}{N^2} + \frac{M^2}{N^2} = 3$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [রা.বো-২৩]
১৯. $2 \cos^2\theta + 2\sqrt{2} \sin\theta = Q$, $Q = 3$ এবং $0^\circ < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। [সি.বো-২৪]
২০. $M = \sin\theta$ এবং $N = \cos\theta$. $12M^2 + 23N = 22$ এবং $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ হলে, $\tan\theta$ এর মান নির্ণয় কর। [রা.বো-২৩]

২১. $x = \sin \theta, y = \cos \theta$ এবং $15x^2 + 2y = 7$ এবং $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর। [ব.বো-২৩]

২২. $x \cos A - y \sin A = z, x = 3, y = -2 \sin A$ এবং $z = 0$ হয়, তবে A এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < A < 2\pi$. [সি.বো-২৩]

২৩. $A = \operatorname{cosec} \theta, B = \cot \theta$ এবং $3A^2 + 3B^2 = 5$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর যেখানে, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. [সি.বো-২২]

২৪. $p \sin^2 \theta + q \cos^2 \theta = 8, p = 9$ এবং $q = 5$ হলে θ এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর; যেখানে $0 < \theta < 2\pi$. [দি.বো-২২]

২৫. $a = \cot \theta, b = \operatorname{cosec} \theta - 1$ এবং $a^2 + (b + 1)^2 = 3$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$. [ঢা.বো-২১]

২৬. $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta - \frac{10}{3} = 0$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$. [সি.বো-২১]

২৭. $\cot^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = \frac{5}{3}$ হয় তবে θ এর মান নির্ণয় কর। [যখন $0 < \theta < 2\pi$] [য.বো-২০]

২৮. $\cot^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = 3$ হলে সমীকরণটি সমাধান কর, যখন $0 \leq \alpha < 2\pi$ [সকল.বো-১৮]

২৯. $7\sin^2 \theta + 3\cos^2 \theta = 6$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। [য.বো-১৭]

৩০. $A = \cos \theta, B = \sin \theta$ এবং $\frac{1}{A^2} + \frac{B^2}{A^2} = \frac{5}{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$. [দি.বো-২১]

৩১. সমাধান কর: $\operatorname{cosec}^2 \theta - (2 + \sqrt{2}) \operatorname{cosec} \theta + 2\sqrt{2} = 0$ দুটি সমীকরণ; যখন $0 < \theta < 2\pi$. [রা.বো-২১]

৩২. যদি $P = 3\tan^2 \theta - 4\sqrt{3}\sec \theta + 7$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২০]

৩৩. $P = \sin \theta, Q = \cos \theta$ এবং $2P^2 + 3Q = 0$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। [য.বো-২২]

৩৪. $M = \cos \theta$ এবং $N = \sin \theta$ এবং $2M^2 + 3N = 0$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। (যখন $0 < \theta < 2\pi$). [চ.বো-২১]

৩৫. $15\sin^2 A + 2\cos A = 7$ হলে $\tan A$ এর মান নির্ণয় কর। [ঢা.বো-২০]


৩৬. $P = \cot \theta, Q = \operatorname{cosec} \theta, R = \cos \theta$ এবং $R^2 Q - \frac{1}{Q} = 1$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে, $0 \leq \theta \leq \pi$. [কু.বো-২১]

৩৭. $B = \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < \theta < 2\pi$. [ম.বো-২১]

Type-10:

১. $a \cos^2 x + b \sin^2 x = c; a > c > b > 0$ হলে প্রমাণ কর যে, $\tan x = \pm \sqrt{\frac{c-a}{b-c}}$. [ম.বো-২৩]

২. ΔABC -এ, $A + B + C = \pi$. হলে প্রমাণ কর যে, $\cos \frac{A+B}{2} + \cot \frac{A+B}{2} = \left(1 + \sec \frac{C}{2}\right) \sin \frac{C}{2}$. [ঢা.বো-২১]



৩. উল্লিখিত চিত্রের আলোকে প্রমাণ কর যে, $\tan A + \tan B + \tan C + \tan D = 0$. [ঢা.বো-১৫]

৪. যদি $\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta = a$ হয়— দেখাও যে, $(a^2 + 1) \cos \theta + (a^2 + 1) \sin \theta = (a + 1)^2 - 2$ [চ.বো-১৫]

সৃজনশীল প্রশ্ন:

অধ্যায়-৮: ত্রিকোণমিতি

অনুশীলনী: ৮.১	১***, ৫, ৬, ১০***, ১১***, উদা-৬***, উদা-৯, প্রতিজ্ঞা-৪
অনুশীলনী: ৮.২	৫, ৬(খ, গ, চ)***, ৭, ৮*, ১০***, ১১***, উদা-১৪***
অনুশীলনী: ৮.৩	৮(চ***), ৯{(গ, ঘ)**}, ১০***, ১২****, ১৩****, উদা-২৫***, উদা-২৭**, উদা-২৯****

১। ঢাকা বোর্ড-২০২৬

$P = 1 - \sin\theta$ এবং $Q = 1 - \cos\theta$ হলো দুটি ত্রিকোণমিতিক রাশি।

(ক) যদি $\theta = \frac{3\pi}{4}$ হয়, তাহলে $\tan\theta + \sec\theta$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{1-(P-Q)}{1-(P+Q)} = \frac{1-Q}{P}$ ।

(গ) যদি $\frac{1-P}{4Q+1} = \frac{1}{4} \operatorname{cosec}\theta$ হয় এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ তাহলে θ এর মান নির্ণয় কর।

২। বরিশাল বোর্ড-২০২৬


$R = \sin\theta$ এবং $S = \cos\theta$

(ক) $\operatorname{cosec}\theta = -2$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) $3R = \sqrt{3}S$ হলে, দেখাও যে, $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$ ।

(গ) $R^2 - S^2 = R$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

৩। কুমিল্লা বোর্ড-২০২৬



(ক) $\sin^2 \frac{3\pi}{4} + \sin^2 \frac{5\pi}{4}$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) চিত্র হতে, $\frac{AD}{OA} + \frac{OD}{OA} = x$ হলে, প্রমাণ কর যে,
 $\operatorname{cosec}\theta = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ ।

(গ) চিত্র হতে, $\left(\frac{AD}{OA}\right)^2 + \left(\frac{OD}{OA}\right)^2 = \frac{5}{3}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর যখন $0 < \theta < 2\pi$ ।

৪। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৬

$$M = \sin^2 \frac{\pi}{15} + \sin^2 \frac{13\pi}{30} + \sin^2 \frac{16\pi}{15} + \sin^2 \frac{47\pi}{30} \text{ এবং } x = \sin\theta, y = \cos\theta.$$

(ক) $\cos\left(-\frac{13\pi}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $M = 2$ ।

(গ) $2(xy + \sqrt{3}) = \sqrt{3}y + 4x$ সমীকরণটি সমাধান কর।
যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ ।

৫। দিনাজপুর বোর্ড-২০২৬

(i) $A = \frac{\pi}{9}, B = \frac{7\pi}{18}, C = \frac{10\pi}{9}$ এবং $D = \frac{11\pi}{18}$ ।

(ii) $P = \sec\theta$ এবং $Q = \tan\theta$ ।


(ক) $\sec\left(\frac{31\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) দেখাও যে, $\sin^2 A + \sin^2 B + \sin^2 C + \sin^2 D = 2$ ।

(গ) সমাধান কর: $P^2 + Q^2 = 7$ যখন $0 < \theta < 2\pi$ ।

৬। যশোর বোর্ড-২০২৬

(i)



(ii) $P = \sec\theta$ এবং $Q = \tan\theta$ ।

(ক) মান নির্ণয় কর: $\cot\left(\theta - \frac{17\pi}{2}\right)$ ।

(খ) $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ ব্যবধিতে সমীকরণটির সমাধান কর:

$$\frac{2m^2}{m^2+n^2} + \frac{3n}{\sqrt{m^2+n^2}} - 3 = 0$$

(গ) $P^2 + 2Q^2 = 2$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

৭। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৬


$Q = \sin\theta$ এবং $P = \cos\theta$ ।

(ক) $\theta = \frac{-35\pi}{6}$ হলে, P এর মান নির্ণয় কর।

(খ) $\frac{1+P}{Q} = (\sqrt{3})^{-1}$ এবং $0 < \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

(গ) $Q = -\frac{5}{13}$ এবং $\frac{P}{Q}$ ধনাত্মক হলে $\frac{\sin(-\theta) + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan(-\theta)}$ এর মান নির্ণয় কর।

৮। রাজশাহী বোর্ড-২০২৬



(ক) $p = \frac{5\pi}{6}$ এবং $q = \frac{\pi}{3}$ হলে, $\frac{\cot p + \cot q}{1 + \cot p \cdot \cot q}$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) যদি $\angle R = \theta, A = \frac{QR}{PR}, B = \frac{PQ}{PR}$ এবং
 $mA - nB = \sqrt{m^2 + n^2 - r^2}$ হয়, তবে প্রমাণ কর
যে, $m\sin\theta + n\cos\theta = r$ ।

(গ) $x + \sqrt{(y+x)(y-x)} = \sqrt{2}y$ হলে, α কোণের

মান নির্ণয় কর, যখন $0^\circ < \alpha < 2\pi$

৯। সিলেট বোর্ড-২০২৬

$P = \sin \theta$ এবং $Q = \cos \theta$

(ক) $\theta = \frac{\pi}{6}$ হলে, দেখাও যে, $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$ ।

(খ) $12P = 5Q$ এবং $Q < 0$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\cos(-\theta) + \sin(-\theta)}{\cot \theta - \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{35}{13}$$

(গ) $6P^2 + 2Q^2 = 3$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর

সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

১০। ঢাকা বোর্ড-২০২৫

$A = \sin \theta - \cos \theta + 1$, $B = \sin \theta + \cos \theta - 1$

এবং $C = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ ।

(ক) $\operatorname{cosec}\left(\frac{-25\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{A}{B} = C$ ।

(গ) $A = 0$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

১১। রাজশাহী বোর্ড-২০২৫

$A = \sin \theta$, $B = \cos \theta$

(ক) একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত $3 : 5 : 4$ হলে, ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণটিকে ষাটমূলক পদ্ধতিতে প্রকাশ কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{A-B+1}{A+B-1} = \frac{B}{1-A}$ ।

(গ) $\frac{A}{B} + \frac{B}{A} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর, যখন $0 < \theta < 2\pi$ ।

১২। যশোর বোর্ড-২০২৫

$p \sin^2 \theta + q \cos^2 \theta = 8$ ।

(ক) $30^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

(খ) $p = 11$ এবং $q = 7$ হলে, দেখাও যে, $\tan \theta = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ ।

(গ) $p = 9$ এবং $q = 5$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর; যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ ।

১৩। কুমিল্লা বোর্ড-২০২৫

$P = \sin \theta$ এবং $Q = \cos \theta$

(ক) $\tan\left(-\frac{25\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{Q-P+1}{Q+P-1} = \frac{\sin \theta}{1-\cos \theta}$ ।

(গ) $2PQ = Q$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

১৪। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৫

$m = \tan \theta$, $n = \sec \theta$ এবং $q = \frac{\cos \theta}{1 - \sin \theta}$ ।

(ক) $85^\circ 15'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{m+n-1}{m-n+1} = q$ ।

(গ) $m^2 + n^2 = \frac{5}{3}$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

১৫। সিলেট বোর্ড-২০২৫

$l \sin \theta + m \cos \theta = n$ এবং $c = \cot \theta$ ।

(ক) একটি চাকা 2.25 কিলোমিটার পথ যেতে 45 বার ঘুরে। চাকাটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় কর।

(খ) দেখাও যে, $l \cos \theta - m \sin \theta = \pm \sqrt{l^2 + m^2 - n^2}$ ।

(গ) সমাধান কর: $c + \frac{1}{c} = \frac{4}{\sqrt{3}}$, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ ।

১৬। বরিশাল বোর্ড-২০২৫

$M = \sin \theta$, $N = \tan \theta$ এবং $R = \sec \theta$

(ক) $15^\circ 30' 18''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

(খ) প্রমাণ কর যে, $\frac{1-N-R}{R-N-1} = \sqrt{\frac{1+M}{1-M}}$

(গ) $M^2 R - \frac{1}{R} = 1$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$

১৭। দিনাজপুর বোর্ড-২০২৫

(i) $5 \sin^2 \theta + 4 \cos^2 \theta = P$; (ii) $\operatorname{cosec} \alpha + \cot \alpha = M$ ।

(ক) $50^\circ 40' 30''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

(খ) যদি $M = \sqrt{2} + \sqrt{3}$ হয় তবে প্রমাণ কর যে, $\sec \alpha = \pm \sqrt{\frac{3}{2}}$ ।

(গ) যদি $2P = 9$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ ।

১৮। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৫

$A = \frac{\cos \theta - \sin \theta + 1}{\cos \theta + \sin \theta - 1}$ এবং $B = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$ ।

(ক) 4 : 35 টার ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

(খ) দেখাও যে, $A = B$ ।

(গ) $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \theta < 2\pi$ ।

১৯। ঢাকা বোর্ড-২০২৪

$3 \cot^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = P$ এবং $Q = \frac{-\sin(-\theta) + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan(-\theta)}$

ক. $20^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. $P = 5$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

গ. $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে, দেখাও যে, $Q = \frac{34}{39}$

২০। রাজশাহী বোর্ড-২০২৪

$a = \cot \theta$ এবং $b = \operatorname{cosec} \theta$

ক. $4\theta = \pi$ হলে, $a + b^2$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $a + b = x$ হলে, দেখাও যে, $\sec \theta = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ । ৪

গ. $3(a^2 + b^2) = 5$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। ৪

২১। যশোর বোর্ড-২০২৪

$A = x \cos \theta$, $B = y \sin \theta$

ক. সকাল ৪ : ৩০ টায় ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণকে ডিগ্রিতে নির্ণয় কর। ২

খ. $A + B = Z$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$x \sin \theta - y \sin \theta = \pm \sqrt{x^2 + y^2 - z^2} \quad 8$$

গ. $x^2 = 3$, $y^2 = 7$ এবং $A^2 + B^2 = 4$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। (যখন $0 < \theta < 2\pi$) 8

২২। কুমিল্লা বোর্ড-২০২৪

$A = \sin \theta$ এবং $B = \cos \theta$.

ক. $\operatorname{cosec} \alpha = \frac{\sqrt{5}}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ হলে, $\sec \alpha$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $\frac{A}{B} = \frac{3}{4}$ এবং $\sin \theta$ ঋণাত্মক হলে প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\cos \theta + \sin \theta}{\sec \theta + \tan \theta} = \frac{14}{5} \quad 8$$

গ. $2AB = A$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। 8

২৩। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৪

(i) $a = \sin \theta$, $b = \cos \theta$

(ii) ঢাকা ও রাজশাহী পৃথিবীর কেন্দ্রে $3^\circ 2' 3''$ কোণ উৎপন্ন করে।

ক. $\sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি.মি. হলে, ঢাকা ও রাজশাহীর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

গ. $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0 < \theta < 2\pi$.

২৪। সিলেট বোর্ড-২০২৪


$\sec \theta - \tan \theta = P$ এবং $2 \cos^2 \theta + 2\sqrt{2} \sin \theta = Q$.

ক. $15' 7''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. $P = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1+x^2}{1-x^2}$.

গ. $Q = 3$ এবং $0^\circ < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

২৫। বরিশাল বোর্ড-২০২৪



ক. $20^\circ 24' 35''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. $\frac{y}{x} + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{x} = a$ হলে প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{2a}{a^2 + 1}$.

গ. $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{4}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

২৬। দিনাজপুর বোর্ড-২০২৪

$a = \operatorname{cosec} \theta$ এবং $b = \cot \theta$.

ক. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 5 : 7 হলে, বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয়মান নির্ণয় কর। ২

খ. $a + b = p$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sec \theta = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$. 8

গ. $3a^2 + 2b^2 = 18$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। 8

২৭। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৪

$P = \frac{\cot A + \operatorname{cosec} A - 1}{\cot A - \operatorname{cosec} A + 1}$ এবং $R = \tan \alpha + \sec \alpha$.

ক. -315° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত চিত্রসহ নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $P = \sqrt{\frac{\sec A + 1}{\sec A - 1}}$.

গ. যদি $R = \sqrt{3}$ এবং $0 < \alpha < 2\pi$ হয়, তবে α এর মান নির্ণয় কর।

২৮। ঢাকা বোর্ড-২০২৩

(i) $\sin \alpha + \cos \alpha = p$ এবং $\sec \alpha + \operatorname{cosec} \alpha = q$

(ii) $a \cos \theta - b \sin \theta = c$.

ক. $\sin^2 15^\circ + \sin^2 75^\circ$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $q(p^2 - 1) = 2p$. 8

গ. যদি $a = b = c = 1$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 8

২৯। রাজশাহী বোর্ড-২০২৩

$M = \sin \theta$ এবং $N = \cos \theta$.

ক. $\cos\left(-\frac{25\pi}{3}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $12M^2 + 23N = 22$ এবং $\frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ হলে, $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর। 8

গ. $\frac{2}{N^2} + \frac{M^2}{N^2} = 3$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। 8

৩০। যশোর বোর্ড-২০২৩

$A = 7 \sin^2 \theta + 3 \cos^2 \theta$

$B = 15 \cos^2 \alpha + 2 \sin \alpha$; যখন $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

ক. 1.532 রেডিয়ানকে ডিগ্রিতে প্রকাশ কর। ২

খ. $A = 4$ হলে, দেখাও যে, $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$. 8

গ. α এর মান নির্ণয় কর। 8

৩১। কুমিল্লা বোর্ড-২০২৩

$A = \sec \theta + \tan \theta$ এবং $B = \sec \theta - \tan \theta$.

ক. $\tan\left(-\frac{25\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{A-1}{1-B} = \frac{\cos \theta}{1-\sin \theta}$.

গ. $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

৩২। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২৩

$a = \sec \theta - \tan \theta$, যেখানে $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

ক. 10 সে.মি. ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের যে চাপ কেন্দ্রে 32° কোণ উৎপন্ন করে, তার দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = \frac{1-a}{1+a}$. 8

গ. $a = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। 8

৩৩। সিলেট বোর্ড-২০২৩

$\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta = P$

এবং $x \cos A - y \sin A = z$.

ক. $40^\circ 21' 20''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। ২

খ. $P = 2$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$\frac{\tan \theta + \sec \theta - 1}{\tan \theta - \sec \theta + 1} = \tan \theta + \sec \theta. \quad 8$$

গ. যদি $x = 3$, $y = -2 \sin A$ এবং $z = 0$ হয়, তবে A এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < A < 2\pi$. 8

৩৪। বরিশাল বোর্ড-২০২৩

$x = \sin \theta$ এবং $y = \cos \theta$.

ক. দেখাও যে, $\operatorname{cosec}^4 \theta - \operatorname{cosec}^2 \theta = \cot^4 \theta + \cot^2 \theta$.

খ. $15x^2 + 2y = 7$ এবং $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. $2(y^2 - x^2) - 1 = 0$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যখন $0 < \theta < 2\pi$.

৩৫। দিনাজপুর বোর্ড-২০২৩

(i) $\tan \alpha + \sec \alpha = A$

(ii) $F(\alpha) = \cos \alpha$

ক. $\cos \beta = \frac{2}{\sqrt{7}}$ হলে, $\cot \beta$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. $F\left(\frac{5\pi}{2} - \alpha\right) = \frac{y^2 - 1}{y^2 + 1}$ হলে, প্রমাণ কর যে, $y^2 - A^2 = 0$.

গ. $A = \sqrt{3}$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর। যখন $0 \leq \alpha \leq 2\pi$.

৩৬। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২৩

$a \cos^2 x + b \sin^2 x = c$; $a > c > b > 0$ এবং $\sin \theta = \frac{5}{13}$.

ক. $\sin A + \sin^2 A = 1$ হলে দেখাও যে, $\cos^2 A + \cos^4 A = 1$. ২

খ. প্রমাণ কর যে, $\tan x = \pm \sqrt{\frac{c-a}{b-c}}$. 8

গ. $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে, দেখাও যে, $\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$. 8

৩৭। ঢাকা বোর্ড-২০২২

একটি পাহাড়ের উচ্চতা 8.848 কিলোমিটার। পাহাড়টির শীর্ষবিন্দু দূরবর্তী কোনো একটি স্থানে 2.25° কোণ উৎপন্ন করে। রতন সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে ঐ স্থান থেকে পাহাড়টি দেখার চেষ্টা করছিল।

ক. $\tan\left(\frac{7\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. পাহাড় থেকে ঐ স্থানটির দূরত্ব নির্ণয় কর। 8

গ. উক্ত সময়ে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণের মানকে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। 8

৩৮। রাজশাহী বোর্ড-২০২২

$B = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$

ক. $\sin(-750^\circ)$ এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $B = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sin \theta = \frac{2x}{x^2 + 1}$. 8

গ. $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \theta \leq 2\pi$ 8

৩৯। রাজশাহী বোর্ড-২০২২

পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি.মি.। পৃথিবী পৃষ্ঠের দুইটি স্থান কেন্দ্রে $30''$ কোণ উৎপন্ন করে। আবার $A = x \cos \theta$ এবং $B = y \sin \theta$.

ক. একটি মুদ্রাকে দুইবার নিক্ষেপ করলে কমপক্ষে একটি টেল আসার সম্ভাবনা কত? ২

খ. পৃথিবী পৃষ্ঠের স্থান দুইটির মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর। 8

গ. $A + B = z$ হলে, প্রমাণ কর যে, $x \sin \theta - y \cos \theta = \pm \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}$. 8

৪০। যশোর বোর্ড-২০২২

$P = \sin \theta$, $Q = \cos \theta$ এবং $R = \tan \theta$.

ক. $\frac{5\pi}{13}$ কে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে প্রকাশ কর। ২

খ. $8P^2 + 5Q^2 = 7$ হলে, প্রমাণ কর যে, $R = \pm \sqrt{2}$. 8

গ. $2P^2 + 3Q = 0$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। 8

৪১। কুমিল্লা বোর্ড-২০২২

$7 \cos^2 \theta + 3 \sin^2 \theta = P$ এবং $A = \sec \theta + \tan \theta$.

ক. $33^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. $P = 4$ হলে, $\cot \theta$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. $A = \sqrt{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

৪২। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২২

$M = \frac{\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta - 1}{\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta + 1}$ এবং $N = \cot \theta + \operatorname{cosec} \theta$.

ক. $\theta = \frac{\pi}{3}$ হলে, দেখাও যে, $N = \sqrt{3}$. ২

খ. প্রমাণ কর যে, $M^2 - N^2 = 0$. 8

গ. $N = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $0 < \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। 8

৪৩। সিলেট বোর্ড-২০২২

$A = \operatorname{cosec} \theta$

$B = \cot \theta$

$C = \sin^2 \frac{\pi}{15} + \sin^2 \frac{13\pi}{30} + \sin^2 \frac{16\pi}{15} + \sin^2 \frac{47\pi}{30}$

ক. $35^\circ 29' 37''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। ২

খ. প্রমাণ কর যে, $C = \sec \frac{\pi}{3}$. 8

গ. $3A^2 + 3B^2 = 5$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর যেখানে, $0 \leq \theta \leq 2\pi$. 8

৪৪। বরিশাল বোর্ড-২০২২

(i) $\operatorname{cosec} \theta + \cot \theta = x$

(ii) $\tan \theta + \sec \theta = y$

ক. 10.5 km দূরে একটি বিন্দুতে কোনো পাহাড় 20° কোণ উৎপন্ন করে। পাহাড়টির উচ্চতা নির্ণয় কর।

খ. দেখাও যে, $\cos \theta = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$.

গ. $y = \sqrt{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর : যখন $0 < \theta < 2\pi$.

৪৫। দিনাজপুর বোর্ড-২০২২

$p \sin^2 \theta + q \cos^2 \theta = 8$.

ক. $\tan \theta = -\sqrt{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0 < \theta < \pi$.

খ. $p = 11$ এবং $q = 7$ হলে, দেখাও যে, $\cot \theta = \pm \sqrt{3}$.

গ. $p = 9$ এবং $q = 5$ হলে θ এর সম্ভাব্য মানসমূহ নির্ণয় কর; যেখানে $0 < \theta < 2\pi$.

৪৬। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২২

$\cot \alpha \operatorname{cosec} \alpha = P$ এবং $5 \cot \theta = 12$.

ক. কোনো ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত $2 : 5 : 8$ হলে, বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয়মান নির্ণয় কর।

খ. $P = 2\sqrt{3}$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$.

গ. $\sin \theta$ ঋণাত্মক হলে প্রমাণ কর যে, $\frac{\cos \theta - \sin(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta} = \frac{51}{26}$

৪৭। ঢাকা বোর্ড-২০২১

$a = \cot \theta$ এবং $b = \operatorname{cosec} \theta - 1$.

ক. $a = 1$ হলে $\sin^2 \theta$ এর মান নির্ণয় কর। যেখানে $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

খ. দেখাও যে, $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$

গ. $a^2 + (b+1)^2 = 3$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

৪৮। ঢাকা বোর্ড-২০২১

ΔABC -এ, $A + B + C = \pi$.

ক. $75^\circ 25'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। 2

খ. $A : B : C = 1 : 2 : 3$ হলে $\tan^2 B + 2 \cos B$ এর মান নির্ণয় কর। 8

গ. প্রমাণ কর যে,

$$\cos \frac{A+B}{2} + \cot \frac{A+B}{2} = \left(1 + \sec \frac{C}{2}\right) \sin \frac{C}{2}. \quad 8$$

৪৯। রাজশাহী বোর্ড-২০২১

$\operatorname{cosec} \theta - \cot \theta = a$, $\cos \theta + \sin \theta = x$

এবং $\cos \theta - \sin \theta = y$ তিনটি ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ।

ক. $x = 1$ হলে দেখাও যে, $\sin \theta - \cos \theta = \pm 1$. 2

খ. ১ম সমীকরণ হতে প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{1-a^2}{1+a^2}$. 8

গ. প্রমাণ কর যে, $\frac{y+1}{x-1} = \frac{\sin \theta}{1 - \cos \theta}$. 8

৫০। রাজশাহী বোর্ড-২০২১

$x \sin \theta + y \cos \theta = z$ এবং $\operatorname{cosec}^2 \theta - (2 + \sqrt{2}) \operatorname{cosec} \theta + 2\sqrt{2} = 0$ দুইটি সমীকরণ।


ক. $40^\circ 55' 54''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর। 2

খ. ১ম সমীকরণ হতে প্রমাণ কর যে,

$$x \cos \theta - y \sin \theta = \pm \sqrt{x^2 + y^2 - z^2}. \quad 8$$

গ. ২য় সমীকরণটি সমাধান কর যখন $0 < \theta < 2\pi$. 8

৫১। যশোর বোর্ড-২০২১



চিত্রে, $AB = OB$ এবং $\sec x - \tan x = (\sqrt{3})^{-1}$, $0 \leq x \leq 2\pi$.

ক. -620° এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে চিত্রসহ নির্ণয় কর।

খ. জ্যামিতিক উপায়ে প্রমাণ কর যে, θ একটি ধ্রুব কোণ।

গ. x এর মান নির্ণয় কর।

৫২। যশোর বোর্ড-২০২১

$P = \sin \theta$; $Q = \cos \theta$ এবং $R = \operatorname{cosec} A$, $\cot A$.

ক. $40^\circ 21' 10''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. দেখাও যে, $\frac{P-Q+1}{P+Q-1} = \frac{1+P}{Q}$.

গ. $R = 2\sqrt{3}$ হলে, A এর মান নির্ণয় কর যেখানে $0 \leq A \leq 2\pi$.

৫৩। কুমিল্লা বোর্ড-২০২১

$P = \cot \theta$, $Q = \operatorname{cosec} \theta$ এবং $R = \cos \theta$.

ক. চিত্রসহ -510° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে নির্ণয় কর। 2


খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{1-P-Q}{Q-P-1} = \sqrt{\frac{1+R}{1-R}}$. 8

গ. $R^2 \cdot Q - \frac{1}{Q} = 1$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর।

যেখানে, $0 \leq \theta \leq \pi$. 8

৫৪। কুমিল্লা বোর্ড-২০২১

(i) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$



ক. $45^\circ 30'$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. (i) নং হতে প্রমাণ কর যে, $\frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)} = \frac{3}{10}$.

গ. (ii) নং হতে $m + \sqrt{n^2 - m^2} = \sqrt{2}n$ হলে α এর মান নির্ণয় কর।

৫৫। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২১

$P = \cot \theta$ এবং $Q = \operatorname{cosec} \theta$.

ক. $\frac{2\pi}{9}$ রেডিয়ানেকে ডিগ্রিতে প্রকাশ কর।

খ. $P - Q = m$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\cos \theta = \frac{1 - m^2}{1 + m^2}$.

গ. $P = \frac{12}{5}$ এবং $\cos \theta$ ঋণাত্মক হলে,

$\frac{\sin \theta + \cos(-\theta)}{\sec(-\theta) + \tan \theta}$ এর মান নির্ণয় কর।

৫৬। চট্টগ্রাম বোর্ড-২০২১

$M = \cos \theta$ এবং $N = \sin \theta$ (যখন $0 < \theta < 2\pi$).

ক. $B = \frac{\pi}{3}$ হলে, দেখাও যে, $\sin 2B = 2 \sin B \cos B$.

খ. $aN - bM = c$ হলে, দেখাও যে,

$$aM + bN = \pm \sqrt{a^2 + b^2 - c^2}.$$

গ. $2M^2 + 3N = 0$ হলে, θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর।

৫৭। সিলেট বোর্ড-২০২১

$\sin \theta - \cos \theta = P$ এবং $y \sin A - x \cos A = Q$.

ক. $40^\circ 35' 20''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

খ. $P = \frac{7}{13}$ হলে, $(\sin \theta + \cos \theta)$ এর মান নির্ণয় কর।

গ. $Q = 0$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$(\sin A - \cos A)^2 = \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2}.$$

৫৮। সিলেট বোর্ড-২০২১

(i) $2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - D\right) = \sqrt{3}$.

(ii) $\tan^2 \theta + \cot^2 \theta - \frac{10}{3} = 0$.

ক. -1465° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত তা চিত্রসহ নির্ণয় কর।


খ. (i) নং এর সাহায্যে প্রমাণ কর যে,

$$3 \sin D - 4 \sin^3 D - \sin 3D = 0.$$

গ. (ii) নং হতে θ এর মান নির্ণয় কর; যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$.

৫৯। বরিশাল বোর্ড-২০২১

দৃশ্যকল্প-১ :



'O' অর্ধবৃত্তের কেন্দ্র এবং ব্যাস, $PQ = 6$ সে.মি.

দৃশ্যকল্প-২ : $B = \cot x + \tan x$; $0 < x < 2\pi$

ক. $18^\circ 33' 45''$ কে বৃত্তীয় এককে প্রকাশ কর।

খ. দৃশ্যকল্প-১ হতে PR চাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর এবং দেখাও $\angle QOR$ প্রবক।

গ. $B = 2$ হলে দৃশ্যকল্প-২ হতে x এর মান নির্ণয় কর।

৬০। বরিশাল বোর্ড-২০২১

(i) $M = \frac{\tan \theta + \sec(-\theta)}{\cot \theta + \operatorname{cosec}(-\theta)}$

(ii) $N = \frac{\pi}{12}$

ক. একটি চাকা 2.88 কিলোমিটার পথ যেতে 120 বার ঘুরে।
চাকাটির ব্যাসার্ধ কত?

খ. $\sin \theta = \frac{5}{13}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, M এর মান নির্ণয় কর।

গ. $\sin^2 N + \sin^2 3N + \sin^2 5N + \sin^2 7N + \sin^2 9N + \sin^2 11N$
এর মান নির্ণয় কর।

৬১। দিনাজপুর বোর্ড-২০২১

(i) $\cot A + \operatorname{cosec} A = m$.

(ii) পৃথিবীর উপরের দুইটি স্থান পৃথিবীর কেন্দ্রে $5^\circ 6' 36''$ কোণ উৎপন্ন করে।

ক. $\cos\left(-\frac{35\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $\cos A = \frac{m^2 - 1}{m^2 + 1}$.

গ. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি. মি. হলে স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় কর।

৬২। দিনাজপুর বোর্ড-২০২১

$A = \cos \theta$ এবং $B = \sin \theta$.

ক. 0.5273 রেডিয়ানেকে ডিগ্রি এককে রূপান্তর কর।

খ. $XA - YB = Z$ হলে, প্রমাণ কর যে,

$$XB + YA = \pm \sqrt{X^2 + Y^2 - Z^2}.$$

গ. $\frac{1}{A^2} + \frac{B^2}{A^2} = \frac{5}{3}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর,

যেখানে $0 < \theta < 2\pi$.

৬৩। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২১

$p \sin \theta + q \cos \theta = a$.

ক. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 5 : 2 : 7। বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয় মান নির্ণয় কর।

খ. $a = \sqrt{p^2 + q^2 - r^2}$ হলে, প্রমাণ কর যে,
 $p \cos \theta = q \sin \theta \pm r$.

গ. $p = q = \sqrt{3}$ এবং $a = \sqrt{6}$ হলে, θ -এর মান নির্ণয় কর।
যেখানে $0 < \theta < 2\pi$.

৬৪। ময়মনসিংহ বোর্ড-২০২১

$$A = \frac{\sin \theta - \cos \theta + 1}{\sin \theta + \cos \theta - 1}$$

$$B = \frac{\sin \theta + 1}{\cos \theta}.$$

ক. $\tan^2 \frac{7\pi}{6} - \cos^2 \frac{5\pi}{4}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ. প্রমাণ কর যে, $A^2 - B^2 = 0$.

গ. $B = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর।

যেখানে $0 < \theta < 2\pi$.

৬৫। ঢাকা বোর্ড ২০২০

$$P = 3 \tan^2 \theta - 4 \sqrt{3} \sec \theta + 7$$

এবং $Q = 15 \sin^2 A + 2 \cos A$, যেখানে A সূক্ষ্মকোণ।

ক. $30^\circ 15' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ কর।

- খ. যদি $P=0$ এবং $0 < \theta < 2\pi$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর। 8
 গ. $Q=7$ হলে $\tan A$ এর মান নির্ণয় কর। 8

৬৬। রাজশাহী বোর্ড ২০২০

$$f(x) = \cos x$$

- ক. $\tan \theta = \frac{3}{4}$ হলে $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান বের কর। ২

- খ. $f(\theta) + f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) - \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। 8

- গ. $f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + f(\theta) = \sqrt{2}f(\theta)$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$f(\theta) - f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sqrt{2}f\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \quad 8$$

৬৭। যশোর বোর্ড ২০২০

$$A = \sec \alpha + \tan \alpha, B = \cot^2 \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta$$

- ক. চিত্রসহ -840° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে নির্ণয় কর। ২

- খ. দেখাও যে, $(A^2 - 1)\operatorname{cosec} \alpha = A^2 + 1$ 8

- গ. যদি $B = \frac{5}{3}$ হয় তবে θ এর মান নির্ণয় কর। [যখন $0 < \theta < 2\pi$] 8

৬৮। কুমিল্লা বোর্ড ২০২০

$$p \sin \theta + q \cos \theta = r \text{ এবং } \tan \alpha = X - \sec \alpha$$

- ক. সকাল ৪:৩০ টায় ঘড়ির ঘণ্টায় কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণকে ডিগ্রিতে নির্ণয় কর। ২

- খ. প্রমাণ কর যে, $p \cos \theta - q \sin \theta = \pm \sqrt{p^2 + q^2 - r^2}$ 8

- গ. $x = 2 \cos \alpha$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর। [যেখানে $0 < \alpha < 2\pi$] 8

৬৯। চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২০

$$A = \tan \theta + \sec \theta.$$

- ক. $\cos \alpha = -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ হলে, α এর মান নির্ণয় কর। ২

- খ. $A = x$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sec \theta = \left(\frac{x}{2} + \frac{1}{2x}\right).$ 8

- গ. $A = \sqrt{3}$ হলে θ এর মান নির্ণয় কর। [যেখানে $0 \leq \theta \leq 2\pi$] 8

৫২। সিলেট বোর্ড ২০২০

$$M = \operatorname{cosec} \theta + \cot \theta, N = 2 \cos^2 \theta + 3 \sin \theta.$$

- ক. 36° কে, রেডিয়ানে প্রকাশ কর। ২

- খ. $N = 3$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর, যখন $0 < \theta < \pi$ 8

- গ. $M = p$ হলে, প্রমাণ কর যে, $\sec \theta = \frac{p^2 + 1}{p^2 - 1}$ 8

৭০। বরিশাল বোর্ড ২০২০

$$P = \operatorname{cosec} x + \cot x \text{ এবং } Q = 13 \sin \theta - 5$$

- ক. যদি $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হয়, তবে θ এর মান নির্ণয় কর।

$$\text{খ. প্রমাণ কর যে, } \operatorname{cosec} x = \frac{1 + p^2}{2p}$$

- গ. যদি $Q = 0$ হয় এবং $\sin \theta$ ধনাত্মক ও $\cos \theta$ ঋণাত্মক হয় তবে

$$\frac{\tan \theta - \sec(-\theta)}{\cot \theta - \operatorname{cosec}(-\theta)} \text{ এর মান নির্ণয় কর।}$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: অধ্যায়-০৮: ত্রিকোণমিতি

অনুশীলনী-৮.১

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক কোণ

১. -1560° কোণটি কোন চতুর্ভাগে থাকবে? [ঢা. বো. '২৫]
 (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়
 (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ
২. -1665° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থান করে? [রা. বো. '২৫]
 (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়
 (গ) দ্বিতীয় (ঘ) চতুর্থ
৩. -1038° এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে? [য. বো. '২৫]
 (ক) ১ম (খ) ২য়
 (গ) ৩য় (ঘ) ৪র্থ
৪. $-\frac{65\pi}{6}$ রেডিয়ান কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [সি. বো. '২৫]
 (ক) ১ম (খ) ২য়
 (গ) ৩য় (ঘ) ৪র্থ

কোণ পরিমাপের একক

৫. বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান চাপ কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন করে তার মান কত? [ব. বো. '২৫]
 (ক) π^c (খ) 1^c
 (গ) π^o (ঘ) 1^o

কোণের বৃত্তীয় পরিমাপ

৬. 60° কোণের সম্পূরক কোণকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি হবে? [ম. বো. '২৫]
 (ক) $\frac{\pi}{6}$ রেডিয়ান (খ) $\frac{\pi}{3}$ রেডিয়ান
 (গ) $\frac{2\pi}{3}$ রেডিয়ান (ঘ) $\frac{5\pi}{3}$ রেডিয়ান
৭. কোনো ত্রিভুজের কোণ তিনটির অনুপাত 2 : 3 : 4 হলে, ক্ষুদ্রতম কোণের বৃত্তীয় মান কত? [কু. বো. '২৫]
 (ক) $\frac{\pi}{9}$ (খ) $\frac{2\pi}{9}$
 (গ) $\frac{4\pi}{9}$ (ঘ) $\frac{\pi}{3}$


কোণের ডিগ্রী পরিমাপ ও রেডিয়ান (বৃত্তীয়) পরিমাপের সম্পর্ক

৮. 12:30 টায় ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত ডিগ্রী? [ঢা. বো. '২৫]
 (ক) 150° (খ) 165°
 (গ) 180° (ঘ) 195°
৯. ঘড়িতে পৌনে নয়টার সময় ঘণ্টার ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণের পরিমাপ কত? [য. বো. '২৫]
 (ক) $7\frac{1}{2}^\circ$ (খ) 15°
 (গ) $22\frac{1}{2}^\circ$ (ঘ) 30°
১০. সকাল 9:25 টায় ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত হবে? [চ. বো. '২৫]
 (ক) -97° (খ) 97°
 (গ) 103.5° (ঘ) 132.5°

অনুশীলনী-৮.২ ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

১১.

[ব. বো. '২৫]



চিত্রানুসারে $\cos \theta$ এর মান কত?

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (ক) $\frac{5}{12}$ | (খ) $\frac{5}{13}$ |
| (গ) $\frac{12}{13}$ | (ঘ) $\frac{12}{5}$ |

রেডিয়ান/ ডিগ্রিতে রূপান্তর

১২. $1^\circ =$ কত রেডিয়ান? [দি.বো. ২০১৫]
 (ক) $\frac{\pi^c}{180}$ (খ) $\frac{\pi D}{180}$
 (গ) $\frac{5\pi^c}{180}$ (ঘ) $\frac{4\pi^c}{180}$
১৩. $2^\circ =$ কত রেডিয়ান? [চ.বো. ২০১৭]
 (ক) $\frac{\pi^o}{45}$ (খ) $\frac{\pi^o}{90}$
 (গ) $\frac{\pi^o}{180}$ (ঘ) $\frac{\pi^o}{360}$
১৪. 90° কোণের বৃত্তীয়মান কোনটি? [য.বো. ২০২৩]
 (ক) $\frac{\pi}{6}$ (খ) $\frac{\pi}{4}$
 (গ) $\frac{\pi}{3}$ (ঘ) $\frac{\pi}{2}$
১৫. 50° কোণের পূরক কোণকে বৃত্তীয় পদ্ধতিতে প্রকাশ করলে নিচের কোনটি হবে? [দি.বো. ২০২১]
 (ক) $\frac{2\pi}{9}$ রেডিয়ান (খ) $\frac{5\pi}{18}$ রেডিয়ান
 (গ) $\frac{13\pi}{918}$ রেডিয়ান (ঘ) $\frac{7\pi}{9}$ রেডিয়ান
১৬. কোনো ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত 2 : 5 : 11 হলে ক্ষুদ্রতম কোণের বৃত্তীয় মান কত? [কু. বো. ২০২৪]
 (ক) $\frac{\pi}{18}$ (খ) $\frac{\pi}{9}$
 (গ) $\frac{5\pi}{18}$ (ঘ) $\frac{11\pi}{9}$
১৭. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান সমান কোণের মান 70° হলে অপর কোণটির মান রেডিয়ানে কত? [কু. বো. ২০১৬]
 (ক) $\frac{\pi}{9}$ (খ) $\frac{9}{2\pi}$
 (গ) $\frac{3\pi}{9}$ (ঘ) $\frac{2\pi}{9}$
১৮. 55° কোণের বৃত্তীয় মান কত? [দি.বো. ২০১৭]
 (ক) $\frac{9\pi}{36}$ (খ) $\frac{11\pi}{36}$
 (গ) $\frac{13\pi}{36}$ (ঘ) $\frac{15\pi}{36}$
১৯. $540^\circ =$ কত রেডিয়ান? [কু. বো. ২০১৫]
 (ক) 2π (খ) 3π
 (গ) 4π (ঘ) 5π
২০. এক রেডিয়ান = কত? [ঢা. বো. ২০১৬]
 (ক) 60° (খ) $59^\circ 17' 481''$
 (গ) $58^\circ 17' 44.81''$ (ঘ) $57^\circ 17' 44.81''$
২১. এক রেডিয়ান = কত? [রা. বো. ২০১৫]
 (ক) 60° (খ) $59^\circ 17' 481''$
 (গ) $58^\circ 17' 44.81''$ (ঘ) $57^\circ 17' 44.81''$

২২. $65^\circ 42'$ এর সঠিক মান কোণটি? [চ. বো. ২০১৭]

- ক) 65.5° খ) 65.6°
গ) 65.7° ঘ) 65.8°

২৩. $30^\circ 12' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ করলে নিচের কোণটি সঠিক?

- ক) 0.6173° খ) 0.6273°
গ) 0.5173° ঘ) 0.5273°

২৪. $45^\circ 25' 36''$ কে রেডিয়ানে প্রকাশ করলে নিচের কোণটি সঠিক?

- ক) 0.1416 খ) 0.7928
গ) 0.8729 ঘ) 0.9728

২৫. 60° কে রেডিয়ানে প্রকাশ করলে নিচের কোণটি সঠিক? [রা. বো. ২০১৭]

- ক) 3.1416 খ) 3.0419
গ) 2.0419 ঘ) 1.0472

২৬. $\frac{2\pi}{11}$ = কত? [ব. বো. ২০১৭]

- ক) $43^\circ 32' 38''$ খ) $32^\circ 43' 38.18''$
গ) $38^\circ 43' 38.18''$ ঘ) $32^\circ 38' 43.18''$


২৭.



চিত্রে $\angle C$ এর বৃত্তীয় মান নিচের কোণটি?

- ক) $\frac{5\pi}{9}$ খ) $\frac{7\pi}{9}$
গ) $\frac{11\pi}{9}$ ঘ) $\frac{13\pi}{9}$


২৮.



প্রদত্ত চিত্রে θ = কত রেডিয়ান?

- ক) 1.92 রেডিয়ান খ) 1 রেডিয়ান
গ) 2.92 রেডিয়ান ঘ) 1.58 রেডিয়ান

২৯.



θ কোণটির বৃত্তীয় মান কত?

- ক) $\frac{\pi}{6}$ খ) $\frac{\pi}{4}$
গ) $\frac{\pi}{3}$ ঘ) $\frac{2\pi}{3}$

৩০. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 1:2:3 হলে বৃহত্তম কোণের বৃত্তীয়মান কত? [দি. বো. ২০২৩]

- ক) $\frac{\pi}{6}$ খ) $\frac{\pi}{4}$
গ) $\frac{\pi}{3}$ ঘ) $\frac{\pi}{2}$

৩১. কোনো ত্রিভুজের কোণ তিনটি অনুপাত 3:4:5 হলে, বৃহত্তম কোণটির বৃত্তীয়মান কত? [চ. বো. ২০২৩]

- ক) $\frac{\pi^c}{12}$ খ) $\frac{\pi^c}{4}$
গ) $\frac{\pi^c}{3}$ ঘ) $\frac{5\pi^c}{12}$

কোণ চতুর্ভাগে অবস্থিত

৩২. -3380° কোণটির অবস্থান কোন চতুর্ভাগে?

[চ. বো. ২০২৪]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩৩. -580° কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[ব. বো. ২০২৪]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩৪. -1060° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[দি. বো. ২০২৪]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৩৫. 430° কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[সি. বো. ২০১৫]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৩৬. -240° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত করে?

[চ. বো. ২০১৫]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩৭. -785° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[য. বো. ২০১৯]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৩৮. -510° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[সি. বো. ২০২০]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৩৯. -840° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[চ. বো. ২০২০]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৪০. -230° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত করে?

[কু. বো. ২০১৫]

- ক) প্রথম চতুর্ভাগে খ) দ্বিতীয় চতুর্ভাগে
গ) তৃতীয় চতুর্ভাগে ঘ) চতুর্থ চতুর্ভাগে

৪১. -665° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত করে?

[য. বো. ২০১৫]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৪২. -980° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[সকল. বো. ২০২২]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৪৩. -1560° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

[দি. বো. ২০১৯]

- ক) প্রথম চতুর্ভাগে খ) দ্বিতীয় চতুর্ভাগে
গ) তৃতীয় চতুর্ভাগে ঘ) চতুর্থ চতুর্ভাগে

৪৪. -1765° কোণটি কোন চতুর্ভাগে থাকবে?

[দি. বো. ২০২০]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৪৫. -570° কোণটি কোন চতুর্ভাগে থাকবে?

[রা. বো. ২০২০]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৪৬. -320° কোণটি কোন চতুর্ভাগে থাকবে?

[ব. বো. ২০২১]

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৪৭. -875° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে?

[চ. বো. ২০২১]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৪৮. -365° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে?

[কু. বো. ২০২১]

- ক) ১ম খ) ২য়
গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ


৪৯. -530° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে? [দি.বো.২০২২]
 ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
 গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ
৫০. -700° কোণের অবস্থান কোন চতুর্ভাগে? [সি. বো.২০২২]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৫১. -638° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [কু. বো.২০২২]
 ক) চতুর্থ খ) তৃতীয়
 গ) দ্বিতীয় ঘ) প্রথম
৫২. -576° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [ঢা. বো.২০২২]
 ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
 গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ
৫৩. -1270° কোণটি কোন চতুর্ভাগে থাকবে? [য. বো.২০২২]
 ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
 গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ
৫৪. -1290° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [ঢা. বো.২০২১]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৫৫. -2295° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [কু. বো.২০২০]
 ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
 গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ
৫৬. -375° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [ব. বো.২০২৩]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৫৭. -1038° কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [চ. বো.২০২৩]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৫৮. $-\frac{85\pi}{18}$ রেডিয়ান কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [দি.বো.২০২২]
 ক) ৪র্থ খ) ৩য়
 গ) ২য় ঘ) ১ম
৫৯. $\tan \theta$ এর মান কোন চতুর্ভাগে ধনাত্মক হয়? [ময়. বো.২০২১]
 ক) ১ম ও ২য় চতুর্ভাগে খ) ২য় ও ৩য় চতুর্ভাগে
 গ) ৩য় ও ৪র্থ চতুর্ভাগে ঘ) ১ম ও ৩য় চতুর্ভাগে
৬০. $\cos(13\pi - \theta)$ এর মান কত? [দি.বো.২০২০]
 ক) $\sin \theta$ খ) $\cos \theta$
 গ) $-\sin \theta$ ঘ) $-\cos \theta$
৬১. $\sin\left(\frac{25\pi}{2} - \theta\right)$ কোন চতুর্ভাগে? [রা. বো.২০১৯]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৬২. θ সূক্ষ্মকোণ হলে, $\left(\frac{25\pi}{2} + \theta\right)$ কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [রা. বো.২০২৩]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৬৩. $\operatorname{cosec} \theta = -\frac{5}{3}$ এবং $\cos \theta > 0$ θ এর অবস্থান কোন চতুর্ভাগে? [সি. বো.২০২৩]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ
৬৪. $\sin \theta = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ এবং $\sin \theta$ ও $\cos \theta$ একই চিহ্নযুক্ত হলে θ কোনটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত হবে? [য. বো.২০১৯]
 ক) ১ম খ) ২য়
 গ) ৩য় ঘ) ৪র্থ

৬৫. $\sin A$ এবং $\cos A$ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট, যেখানে $\cos A = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ A কোণটি কোণ চতুর্ভাগে অবস্থিত? [রা. বো.২০২২]
 ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
 গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ

৬৬. $\sin A = \frac{2}{\sqrt{5}}$ এবং $\sin A$ ও $\cos A$ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হলে A কোণটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত? [দি.বো.২০১৭]
 ক) প্রথম খ) দ্বিতীয়
 গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ


বৃত্তচাপ সম্পর্কিত

৬৭. 180π মিটার পথ যেতে একটি চাকা 30 বার ঘোরে। চাকাটির ব্যাসার্ধ কত? [সি.বো.২০২৪]
 ক) ২ মিটার খ) ৩ মিটার
 গ) ৪ মিটার ঘ) ৬ মিটার
৬৮. r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট কোনো বৃত্তে s দৈর্ঘ্যের কোনো চাপ কেন্দ্রে θ কোণ উৎপন্ন করলে নিচের কোনটি সত্য? [দি.বো.২০১৮]
 ক) $r = s\theta$ খ) $\theta = sr$
 গ) $\theta = \frac{s}{r}$ ঘ) $s = \frac{\theta}{r}$
৬৯. নিচের কোনটি সঠিক? [য. বো.২০১৭]
 ক) $r = s\theta$ খ) $s = \frac{r}{\theta}$
 গ) $r = \frac{\theta}{s}$ ঘ) $s = r\theta$
৭০. ২ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের একটি চাপ কেন্দ্রে 90° কোণ উৎপন্ন করলে চাপের দৈর্ঘ্য কত সে.মি. হবে? [কু. বো.২০২৩]
 ক) π সে.মি. খ) $\frac{3\pi}{2}$ সে.মি.
 গ) 2π সে.মি. ঘ) 4π সে.মি.
৭১. ৫ সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কেন্দ্রে কোনো চাপ 60° কোণ উৎপন্ন করলে চাপের দৈর্ঘ্য কত হবে? [সি. বো.২০২২]
 ক) ২.৬ সে.মি (প্রায়) খ) ৩.২ সে.মি (প্রায়)
 গ) ১৫০ সে.মি ঘ) ৩০০ সে.মি
৭২. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের চাপ $BD = 12$ সে.মি. হলে $OB =$ কত? [যখন $\theta = 40^\circ$] [ঢা. বো.২০২২]
 ক) ০.৭০ সে.মি (প্রায়) খ) ৩.৩৩ সে.মি (প্রায়)
 গ) ১২.০০ সে.মি (প্রায়) ঘ) ১৭.১৯ সে.মি (প্রায়)
৭৩. O কেন্দ্রবিশিষ্ট ABP বৃত্তের $PB = 8$ সে.মি. হলে, $OB =$ কত? [কু. বো.২০২০]



- ক) ২ সে.মি. খ) ৪ সে.মি.
 গ) ৪ সে.মি. ঘ) ১৬ সে.মি.

৭৪.



চিত্রে, O বৃত্তের কেন্দ্র এবং চাপ $AB = 60$ সে.মি হলে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত? [সি. বো.২০১৯]

- ক) $\frac{\pi}{180}$ সে.মি. খ) π সে.মি.
 গ) $\frac{180}{\pi}$ সে.মি. ঘ) 20π সে.মি.

৭৫. কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ 9 সে.মি। বৃত্তের 15 সে.মি দীর্ঘ চাপের কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ কত? [দি.বো.২০১৯]

- ক) 0.60 রেডিয়ান (প্রায়) খ) 0.83 রেডিয়ান (প্রায়)
গ) 1.67 রেডিয়ান (প্রায়) ঘ) 17.19 রেডিয়ান (প্রায়)


৭৬. কোনো বৃত্তের ব্যাসার্ধ 7 সে.মি। বৃত্তের 14 সে.মি দীর্ঘ চাপের কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ কত ডিগ্রি? [য. বো.২০১৫]

- ক) $\frac{\pi}{360}$ খ) $\frac{\pi}{180}$
গ) $\frac{\pi}{360}$ ঘ) $\frac{\pi}{1260}$

৭৭. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 5 সে.মি। বৃত্তে 13 সে.মি. দীর্ঘ চাপের কেন্দ্রস্থ কোণের পরিমাণ কত? [ঢা. বো.২০১৬]

- ক) 0.38 ডিগ্রি খ) 0.38 রেডিয়ান
গ) 2.60 রেডিয়ান ঘ) 2.60 ডিগ্রি

৭৮. পাশের চিত্র অনুসারে $AB =$ কত? [য. বো.২০২১]



- ক) 90π খ) 30π
গ) 60π ঘ) 15π

৭৯. 450 কিলোমিটার দূরে একটি বিন্দুতে কোনো পাহাড় 7° কোণ উৎপন্ন করে। পাহাড়টির উচ্চতা কত? [চ. বো.২০২০]

- ক) 916 মিটার খ) 1000 মিটার
গ) 1100 মিটার ঘ) 2700 মিটার

৮০. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কিলোমিটার। দিনাজপুর ও রংপুর পৃথিবীর কেন্দ্রে 3° কোণ উৎপন্ন করে। দিনাজপুর ও রংপুরের দূরত্ব কত কিলোমিটার? [রা. বো.২০২১]

- ক) 307.2 খ) 317.2
গ) 327.2 ঘ) 337.2

৮১. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 কি.মি। ঢাকা ও চট্টগ্রাম পৃথিবীর কেন্দ্রে 3° কোণ উৎপন্ন করে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের দূরত্ব কত? [ঢা. বো.২০২১]

- ক) 368.98 কি.মি (প্রায়) খ) 337.20 কি.মি (প্রায়)
গ) 107.33 কি.মি (প্রায়) ঘ) 35.78 কি.মি (প্রায়)

৮২. সজীব সকাল 7:30 টায় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সকাল 7:45 টায় বিদ্যালয়ে পৌঁছায়। তার ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য 4 মি.মি। বাড়ি থেকে বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছাতে মিনিটের কাঁটার অগ্রভাগ কত দূরত্ব অতিক্রম করে? [ম. বো.২০২৩]

- ক) π মি.মি খ) $\frac{3\pi}{2}$ মি.মি
গ) 2π মি.মি ঘ) $\frac{5\pi}{2}$ মি.মি

চাকা সম্পর্কিত


৮৩. একটি বৃত্তের ব্যাস ৩.১৪১৬ মিটার হলে, বৃত্তটির পরিধি কত মিটার?

- ক) 11.407 খ) 19.239
গ) 9.870 ঘ) 7.152

৮৪. একটি চাকার ব্যাস ১৪ সে.মি হলে, এর পরিধির আসন্ন মান কত সে.মি? [কু. বো.২০২২]

- ক) 307.88 খ) 175.93
গ) 153.94 ঘ) 43.98

৮৫.



উদ্দীপকের বৃত্তটির ব্যাসার্ধের সমান ব্যাসার্ধবিশিষ্ট চাকার এক বার ঘুরে কত দূরত্ব অতিক্রম করে? [চ.বো.২০২২]

- ক) 78.54 সে.মি খ) 62.84 সে.মি
গ) 31.42 সে.মি ঘ) 9.60 সে.মি

৮৬. দুটি চাকার পরিধির পার্থক্য 40 সে.মি হলে, তাদের ব্যাসার্ধের পার্থক্য কত সে.মি? [ব. বো.২০২২]

- ক) 6.17 (প্রায়) খ) 12.73 (প্রায়)
গ) 12 ঘ) 20

৮৭. দুটি চাকার পরিধির পার্থক্য 90 সে.মি হলে, তাদের ব্যাসার্ধের পার্থক্য কত সে.মি? [চ. বো.২০২১]

- ক) 5.35 (প্রায়) খ) 10.70 (প্রায়)
গ) 14.32 (প্রায়) ঘ) 28.64 (প্রায়)

৮৮. একটি চাকা 1.75 কিমি পথ যেতে 50 বার ঘোরে। চাকাটির ব্যাস কত? [ম. বো.২০২৪]

- ক) 14.41 মিটার (প্রায়) খ) 14.11 মিটার (প্রায়)
গ) 11.14 মিটার (প্রায়) ঘ) 11.05 মিটার (প্রায়)

৮৯. একটি চাকা 120π সে.মি পথ যেতে 12 বার ঘুরে। চাকাটির ব্যাস কত? [ঢা. বো.২০২২]

- ক) 3.16 সে.মি (প্রায়) খ) 5 সে.মি
গ) 6.32 সে.মি (প্রায়) ঘ) 10 সে.মি (প্রায়)

৯০. একটি চাকা বৃত্তাকার পথে 250 মিটার পথ যেতে 35 বার ঘুরে। চাকার ব্যাসার্ধ কত? [ব. বো.২০১৯]

- ক) 1.137 মিটার (প্রায়) খ) 1.5 মিটার (প্রায়)
গ) 1.6 মিটার (প্রায়) ঘ) 1.71 মিটার (প্রায়)

৯১. একটি চাকা 1.75 কি.মি পথ যেতে 40 বার ঘুরে, চাকাটির ব্যাসার্ধ কত? [সি. বো.২০২১]

- ক) 21.88 মিটার (প্রায়) খ) 9.67 মিটার (প্রায়)
গ) 7.67 মিটার (প্রায়) ঘ) 6.96 মিটার (প্রায়)

৯২. একটি গাড়ির চাকার ব্যাস 0.8 মিটার এবং চাকাটি প্রতি সেকেন্ডে 6 বার ঘুরে। গাড়িটির গতিবেগ কত? [ম. বো.২০২১]

- ক) 9 কি.মি/ঘন্টা (প্রায়) খ) 27 কি.মি/ঘন্টা (প্রায়)
গ) 54 কি.মি/ঘন্টা (প্রায়) ঘ) 108 কি.মি/ঘন্টা (প্রায়)

ঘড়ির ঘন্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ

৯৩. বিকাল 3:30 টায় ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত? [ঢা.বো.২০২৪]

- ক) 75° খ) 85°
গ) 90° ঘ) 95°

৯৪. সকাল 9:45 টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত? [সি. বো.২০২৪]

- ক) 0 রেডিয়ান খ) $\frac{\pi}{12}$ রেডিয়ান
গ) $\frac{\pi}{8}$ রেডিয়ান ঘ) $\frac{\pi}{4}$ রেডিয়ান

৯৫. সকাল 9:00 টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত? [দি.বো.২০২২]

- ক) $\frac{\pi}{4}$ রেডিয়ান খ) $\frac{\pi}{2}$ রেডিয়ান
গ) π রেডিয়ান ঘ) 2π রেডিয়ান

৯৬. সকাল 6:00 টায় ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত রেডিয়ান? [ঢা. বো.২০১৫]

- [সি. বো.২০১৫] খ) $\frac{\pi}{2}$
গ) π ঘ) 2π

৯৭. সকাল 9:00 টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত? [দি.বো.২০২২]

- ক) $\frac{\pi}{2}$ রেডিয়ান খ) $\frac{\pi}{3}$ রেডিয়ান
গ) $\frac{\pi}{4}$ রেডিয়ান ঘ) $\frac{\pi}{6}$ রেডিয়ান

৯৮. 4 টায় সময় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত ডিগ্রী হবে? [সি. বো.২০২১]

- ক) 90° খ) 105°
গ) 120° ঘ) 130°

৯৯. বিকাল 4 টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত ডিগ্রী হবে? [রা. বো.২০২২]

- ক) 90° খ) 105°
গ) 120° ঘ) 130°

১০০. দুপুর ১: ২০ টায় ঘড়ির ঘন্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রী? [কু. বো. ২০২৩]

- ক) 80° খ) 90°
গ) 110° ঘ) 120°

১০১. ৬: ৩০am টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত? [য. বো. ২০২২]

- ক) 180° খ) 30°
গ) 15° ঘ) 0°

১০২. সকাল ১০: ১৫ মিনিটের সময় ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত? [ঢা. বো. ২০২১]

- ক) 23.75° খ) 142.5°
গ) 150° ঘ) 285°

১০৩. ৬: ১৫am ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত ডিগ্রী?

- ক) ২৬২.৫ খ) ৯৭.৫
গ) -৯৭.৫ ঘ) -২৬২.৫

১০৪. ২: ১৬ টার সময় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণের পরিমাণ কত? [য. বো. ২০২১]

- ক) 18° খ) 26°
গ) 28° ঘ) 30°

১০৫. ৭: ৩৫am এর ঘন্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত? [ঢা. বো. ২০২২]

- ক) -১৭.৫ খ) -১৫.৫
গ) ১৫.৫ ঘ) ১৭.৫

১০৬. সকাল ৯: ২৫ টার সময় ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত? [য. বো. ২০২০]

- ক) 120° খ) 127.5°
গ) 132.5° ঘ) 197°

১০৭. ২: ৩০ টার সময় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণের পরিমাণ কত? [ম. বো. ২০২০]

- ক) 210° খ) 105°
গ) 132.5° ঘ) 197°

১০৮. সকাল ৮: ৩০ টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত ডিগ্রী? [সকল. বো. ২০১৮]

- ক) ১০৫ খ) ৯০
গ) ৭৫ ঘ) ৬০

১০৯. দুপুর ১: ২০ টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত? [কু. বো. ২০১৭]

- ক) 80° খ) 90°
গ) 100° ঘ) 111°

১১০. সকাল ৮: ২০ টায় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত হবে? [দি. বো. ২০১৭]

- ক) 140° খ) 130°
গ) 115° ঘ) 110°

১১১. সজীব সকাল ৭: ৩০ টায় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সকাল ৭: ৪৫ টায় বিদ্যালয়ে পৌছায়। তার ঘড়ির মিনিটের কাঁটার দৈর্ঘ্য ৪ মি.মি। সজীবের রওনা হওয়ায় সময় ঘড়ির ঘন্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণ কত হবে? [ম. বো. ২০২৩]

- ক) $\frac{\pi}{4}$ রেডিয়ান খ) $\frac{\pi}{3}$ রেডিয়ান
গ) $\frac{5\pi}{12}$ রেডিয়ান ঘ) $\frac{7\pi}{12}$ রেডিয়ান

ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান নির্ণয়

১১২. $\cos 120^\circ$ এর মান কত? [সি. বো. ২০১৯]

- ক) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $-\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১১৩. $\cos(-300^\circ)$ এর মান কত? [ঢা. বো. ২০২০]

- ক) $\frac{1}{2}$ খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
গ) $-\frac{1}{2}$ ঘ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

১১৪. $\sin 120^\circ$ এর মান কত?

- ক) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ) $-\frac{1}{2}$

১১৫. $\sin 120^\circ$ এর মান কত?

- ক) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ) $-\frac{1}{2}$

১১৬. $\cos(-330^\circ)$ এর মান কত?

- ক) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $-\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১১৭. $\tan(-1140^\circ) =$ কত?

- ক) $-\sqrt{3}$ খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ঘ) $\sqrt{3}$

১১৮. $\tan\left(\frac{5\pi}{6}\right)$ এর মান কত?

- ক) $\sqrt{3}$ খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ ঘ) $-\sqrt{3}$

১১৯. $\tan\left(-\frac{17\pi}{6}\right)$ এর মান কোনটি?

- ক) $-\sqrt{3}$ খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ঘ) $\sqrt{3}$

১২০. $\cos\left(-\frac{35\pi}{6}\right)$ এর মান কত?

- ক) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $\frac{1}{2}$
গ) $-\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১২১. $\cos\left(-\frac{19\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

- ক) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $-\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১২২. $\cos\left(-\frac{31\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

- ক) ১ খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

১২৩. $\cos\left(-\frac{25\pi}{3}\right)$ এর মান কোনটি?

- ক) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

১২৪. নিচের কোনটি $\tan\left(-\frac{25\pi}{6}\right)$ এর মান

- ক) -১ খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ঘ) ১

১২৫. $\operatorname{cosec}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

- ক) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ খ) $-\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

১২৬. $\operatorname{cosec}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ এর মান কত?

- ক) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$ খ) $-\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

১২৭. $\cos\left(2\pi + \frac{\pi}{6}\right)$ এর মান নিচের কোনটি?

[য. বো. ২০১৬]

- ক $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঘ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

১২৮. $\sec\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right)$ এর মান কত?

[সি. বো. ২০১৭]

- ক $-\sqrt{2}$ খ $-\frac{2}{\sqrt{3}}$
গ $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ঘ $\sqrt{2}$

১২৯. $\cot\left(\theta - \frac{11\pi}{2}\right) = \text{কত?}$

[য. বো. ২০২১]

- ক $\cot \theta$ খ $\tan \theta$
গ $\pm \tan \theta$ ঘ $-\tan \theta$

১৩০. $\tan\left(\theta - \frac{11\pi}{2}\right)$ এর মান কোনটি?

[চ. বো. ২০২২]

- ক $\tan \theta$ খ $-\tan \theta$
গ $\cot \theta$ ঘ $-\cot \theta$

১৩১. $\cot\left(\theta - \frac{9\pi}{2}\right)$ এর মান কত?

[রা. বো. ২০২২]

- ক $\tan \theta$ খ $-\tan \theta$
গ $\cot \theta$ ঘ $-\cot \theta$

১৩২. $\tan\left(\theta - \frac{13\pi}{2}\right)$ এর মান কত?

[ব. বো. ২০২৩]

- ক $-\cot \theta$ খ $-\tan \theta$
গ $\cot \theta$ ঘ $\tan \theta$

১৩৩. যদি $\cot\left(\frac{n\pi}{4} + \theta\right) = 1$ এবং $\theta = -\frac{\pi}{2}$ হয়, তবে n -এর মান কত? [রা. বো. ২০২১]

- ক 1 খ 2
গ 3 ঘ 4

১৩৪. যদি $\cot\left(\frac{n\pi}{2} + \theta\right) = 1$ এবং $\theta = -\frac{\pi}{4}$ হয়, তবে n -এর মান কত? [রা. বো. ২০২১]

- ক 1 খ 2
গ 4 ঘ 0

১৩৫. $\cos^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \frac{\pi}{4}$ এর মান কত?

[ঢা. বো. ২০১৬]

- ক $-\frac{1}{4}$ খ $-\frac{1}{2}$
গ $\frac{1}{2}$ ঘ 1

১৩৬. $\cos^2 \frac{\pi}{3} - \sin^2 \frac{\pi}{3}$ = কত?

[ব. বো. ২০১৯]

- ক $-\frac{1}{2}$ খ $-\frac{1}{4}$
গ $\frac{1}{2}$ ঘ 1

১৩৭. $\sec^2 \frac{\pi}{6} - \sin^2 \frac{\pi}{6}$ এর মান নিচের কোনটি?

[য. বো. ২০২০]

- ক $\frac{1}{4}$ খ $\frac{1}{2}$
গ 1 ঘ $\frac{5}{4}$

১৩৮. $\sec^2 \frac{\pi}{4} + \sin^2 \frac{\pi}{4}$ এর মান কত?

[সি. বো. ২০১৭]

- ক $\frac{2}{9}$ খ $\frac{1}{2}$
গ $\frac{17}{4}$ ঘ $\frac{5}{2}$

১৩৯. $\sin^2(-\theta) + \cos^2(\theta) = \text{কত?}$

[ব. বো. ২০১৭]

- ক -1 খ 0
গ 1 ঘ অসজ্জায়িত

১৪০. $\cos^2 \frac{4\pi}{3} + \operatorname{cosec}^2 \frac{3\pi}{4} = \text{কত?}$

[দি. বো. ২০২১]

- ক $\frac{17}{4}$ খ $\frac{11}{4}$
গ $\frac{9}{4}$ ঘ $\frac{7}{4}$

১৪১. $\sin^2 \frac{2\pi}{3} + \cos^2 \frac{\pi}{3} = \text{কত?}$

[য. বো. ২০২২]

ক $\frac{5}{2}$

খ $\frac{1}{2}$

গ 1

ঘ $\frac{3}{2}$

১৪২. $\sin^2\left(2\pi - \frac{\pi}{6}\right)$ এর মান নিচের কোনটি?

[রা. বো. ২০১৭]


ক $-\frac{1}{4}$

খ $-\frac{1}{2}$

গ $\frac{1}{4}$

ঘ $\frac{1}{2}$

১৪৩.



ΔPOQ -এ $\cot \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = \text{কত?}$

[য. বো. ২০১৫]

ক $-\frac{19}{4}$

খ $-\frac{7}{4}$

গ $\frac{7}{4}$

ঘ $\frac{19}{4}$

১৪৪. $\sin^2 \theta = 0$ হলে, $\frac{2 \tan \theta}{1 + \tan^2 \theta}$ এর মান কত?

[সি. বো. ২০২১]

ক 2

খ 1

গ $\frac{1}{3}$

ঘ 0

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত থেকে θ এর মান নির্ণয়

১৪৫. $\tan \theta = -\sqrt{3}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, θ এর মান কত?

[ব. বো. ২০২৩]

ক $\frac{5\pi}{3}$
গ $\frac{\pi}{3}$

খ $\frac{2\pi}{3}$
ঘ $-\frac{\pi}{3}$

১৪৬. $\tan \theta = -1$ এবং $0 < \theta < \pi$ হলে, θ এর মান কত?

[সি. বো. ২০২২]

ক $\frac{\pi}{4}$
গ $\frac{5\pi}{4}$

খ $\frac{3\pi}{4}$
ঘ $\frac{7\pi}{4}$

১৪৭. $\tan x = -\sqrt{3}$ এবং $\frac{\pi}{2} < x < \pi$ হলে, x -এর মান কত?

[চ. বো. ২০২১]

ক $\frac{\pi}{3}$
গ $\frac{4\pi}{3}$

খ $\frac{2\pi}{3}$
ঘ $\frac{5\pi}{3}$

১৪৮. $\tan \theta = \sqrt{3}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, θ এর মান কত?

[দি. বো. ২০১৯]

ক $\frac{\pi}{3}$
গ $\frac{4\pi}{3}$

খ $\frac{2\pi}{3}$
ঘ $\frac{5\pi}{6}$

১৪৯. $\tan\left(\frac{3\pi}{2} + y\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, y এর মান কত?

[দি. বো. ২০১৮]

ক -60°

খ -30°

গ 30°

ঘ 60°

১৫০. $\tan^2 A = 3$ এবং $\frac{\pi}{2} < A < \pi$ হলে, A এর মান নিচের কোনটি?

[য. বো. ২০২৩]

ক $\frac{\pi}{6}$
গ $\frac{\pi}{3}$

খ $\frac{\pi}{4}$
ঘ $\frac{2\pi}{3}$

১৫১. $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, θ এর মান কত?

[য. বো. ২০১৫]

ক $\frac{5\pi}{3}$
গ $\frac{2\pi}{3}$

খ $\frac{4\pi}{3}$
ঘ $\frac{2\pi}{3}$

১৫২. $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, θ এর মান কত?

[য. বো.২০২২]

ক $\frac{2\pi}{3}$
গ $\frac{7\pi}{6}$

খ $\frac{5\pi}{6}$
ঘ $\frac{4\pi}{3}$

১৫৩. $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$ হলে, α এর মান কত?

[সি. বো.২০১৬]

ক $\frac{5\pi}{6}$
গ $\frac{7\pi}{5}$

খ $\frac{2\pi}{3}$
ঘ $\frac{4\pi}{5}$

১৫৪. $\cos \theta = \frac{1}{2}$ এবং $\pi < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান কত?

[সকল.২০১৮]

ক $\frac{\pi}{3}$
গ $\frac{5\pi}{3}$

খ $\frac{4\pi}{3}$
ঘ $\frac{11\pi}{6}$

১৫৫. $\sin^2 \theta = \frac{1}{4}$; যখন $\pi \leq \theta \leq \frac{3\pi}{2}$ তবে, θ এর মান কত?

[রা. বো.২০১৯]

ক $\frac{\pi}{6}$
গ $\frac{7\pi}{6}$

খ $\frac{5\pi}{6}$
ঘ $\frac{4\pi}{3}$


১৫৬. $\sec \theta = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, θ এর মান কত?

[ব. বো.২০২২]

ক $\frac{\pi}{6}$
গ $\frac{5\pi}{6}$

খ $\frac{2\pi}{3}$
ঘ $\frac{7\pi}{6}$

পিথাগোরাসের উপপাদ্যের মাধ্যমে সমকোণী ত্রিভুজের বাহুর মান নির্ণয়
১৫৭.




$\angle P$ সূক্ষ্মকোণ হলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত?

[য. বো.২০১৬]

ক OP
গ PM

খ OM
ঘ $\sqrt{1+x^2}$

১৫৮.




$\angle A$ সূক্ষ্মকোণ হলে ভূমির দৈর্ঘ্য কত?

[রা. বো.২০২২]

ক 1
গ $\frac{1}{x}$

খ x
ঘ $\sqrt{1+x^2}$

১৫৯.




PM এর দৈর্ঘ্য কত?

[য. বো.২০১৬]

ক $\sqrt{1-x^2}$
গ $\sqrt{1+x^2}$

খ $\frac{1}{x}$
ঘ $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

১৬০.




AC বাহুর মান কত?

[দি. বো.২০১৭]

ক $\sqrt{2}$
গ 2

খ $\sqrt{3}$
ঘ 4

১৬১.




AC বাহুর মান কত?

[য. বো.২০১৯]

ক 20 সে.মি
গ 10 সে.মি

খ 15 সে.মি
ঘ 5 সে.মি

১৬২.




AB = কত?

[ম. বো.২০২১]

ক $a^2 - b^2$
গ $\sqrt{a^2 - b^2}$

খ $b^2 - a^2$
ঘ $\sqrt{b^2 - a^2}$

১৬৩.




চিহ্নে PR এর দৈর্ঘ্য কত?

[সি. বো.২০১৭]

ক $2\sqrt{3}$ cm
গ $6\sqrt{3}$ cm

খ $4\sqrt{3}$ cm
ঘ 12 cm

১৬৪.




চিহ্নে $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে c ও a এর সম্পর্ক কোনটি?

[রা. বো.২০২৩]

ক $c > a$
গ $c \geq a$

খ $c < a$
ঘ $c \leq a$

১৬৫.




$\sin \theta + \cos \theta$ এর মান নিচের কোনটি?

[রা. বো.২০২৩]

ক $\frac{a+c}{\sqrt{a^2+c^2}}$
গ $\frac{a}{\sqrt{a^2+c^2}}$

খ $\frac{\sqrt{a^2+c^2}}{a+c}$
ঘ $\frac{c}{\sqrt{a^2+c^2}}$

১৬৬.




এখানে, $SQ = SP$ হলে $\angle PQS$ এর মান কত?

- ক) 30° খ) 45°
গ) 60° ঘ) 75°

[দি.বো.২০১৯]

১৬৭.




$\frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ এর মান কত?

- ক) $-\sqrt{2}$ খ) $-\sqrt{3}$
গ) $\sqrt{2}$ ঘ) $\sqrt{3}$

[দি.বো.২০১৬]

ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান থেকে ত্রিকোণমিতিক
অনুপাতের মান নির্ণয়

১৬৮.



$PQ = 1$ এবং $QR = \sqrt{2}$ হলে, $\sin(-\theta) + \cos(-\theta)$ এর মান কত?

- ক) $-\sqrt{2}$ খ) 0
গ) 1 ঘ) $\sqrt{2}$

[ঢা.বো.২০২৪]

১৬৯. $\cos^2 \theta = \frac{3}{4}$ হলে, $\tan^2 \theta$ এর মান কোনটি?

- ক) $\frac{1}{4}$ খ) $\frac{1}{3}$
গ) $\frac{7}{9}$ ঘ) $\frac{3}{7}$

[ব. বো.২০২৪]

১৭০. $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান কত?

- ক) $\frac{1}{2}$ খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
গ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ঘ) 2

[দি.বো.২০২১]

১৭১. $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হলে, $\cos 2A$ এর মান কত?

- ক) -1 খ) 0
গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ) 1

[রা. বো.২০২০]

১৭২. $\tan \theta = \sqrt{3}$ হলে, $\sin \theta$ এর মান কত?

- ক) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ খ) $\frac{1}{2}$
গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঘ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

[দি.বো.২০১৮]

১৭৩. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\sin 3\theta =$ কত?

- ক) 0 খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) 1

[ব. বো.২০১৬]

১৭৪. $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হলে, $\cos 2\theta$ এর মান কত?

- ক) 0 খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
গ) 1 ঘ) $\sqrt{2}$

[ব. বো.২০২১]

১৭৫. $\cot \theta = \sqrt{3}$ হলে, $\sin 2\theta$ এর মান কত?

- ক) 1 খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

[চ. বো.২০২১]

গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

ঘ) $\frac{1}{2}$

১৭৬. $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\cos 2\theta$ এর মান কত?

[য. বো.২০২৩]

ক) 0

খ) $\frac{1}{2}$

গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ঘ) 1

১৭৭. $2\cos A = \sqrt{2}$ হলে, $\tan 3A$ এর মান নিচের কোনটি?

ক) 1

খ) $\frac{1}{2}$

গ) $-\frac{1}{2}$

ঘ) -1

১৭৮. $\cos A = \frac{1}{2}$ এবং $\frac{3\pi}{2} < A < 2\pi$ হলে $\sin A$ এর মান কত?

[দি.বো.২০২৩]

ক) $\frac{2}{\sqrt{3}}$

খ) $-\frac{2}{\sqrt{3}}$

গ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

১৭৯. $\cot \theta = 2$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\cos \theta$ এর মান কত?

[চ. বো.২০২২]

ক) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) $-\frac{2}{\sqrt{5}}$

ঘ) $\frac{2}{\sqrt{5}}$

১৮০. $\tan \theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, θ এর মান কত?

[কু. বো.২০২২]

ক) $\frac{\pi}{6}$

খ) $\frac{2\pi}{3}$

গ) $\frac{5\pi}{6}$

ঘ) $\frac{7\pi}{6}$

১৮১. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\cot \theta$ এর মান কত?

[দি.বো.২০২১]

ক) $\sqrt{3}$

খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

ঘ) $-\sqrt{3}$

১৮২. $\cos A = \frac{4}{5}$ এবং $\frac{3\pi}{2} < A < 2\pi$ হলে $\tan A$ এর মান কত?

[ম. বো.২০২১]

ক) $-\frac{3}{4}$

খ) $-\frac{\sqrt{41}}{4}$

গ) $\frac{3}{4}$

ঘ) $\frac{\sqrt{41}}{4}$

১৮৩. $\tan \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\cos \theta$ এর মান কত?

[কু. বো.২০২০]

ক) $-\frac{5}{4}$

খ) $-\frac{4}{5}$

গ) $\frac{4}{5}$

ঘ) $\frac{5}{4}$

১৮৪. $\cos \theta = -\frac{1}{2}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত?

[ব. বো.২০১৬]

ক) $\sqrt{3}$

খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) 1

ঘ) $\sqrt{3}$

১৮৫. $\sin \theta = -\frac{4}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, $\cos \theta$ এর মান কত?

[য. বো.২০২২]

ক) $-\frac{5}{3}$

খ) $-\frac{3}{5}$

গ) $\frac{3}{5}$

ঘ) $\frac{5}{3}$

১৮৬. $\tan \theta = 3\sqrt{3}$ হলে, $\cos \theta =$ কত?

[কু. বো.২০২৩]

ক) $\frac{3}{2\sqrt{7}}$

খ) $\frac{1}{2\sqrt{7}}$

গ) $\frac{3}{7\sqrt{7}}$

ঘ) $\frac{3}{3\sqrt{7}}$

১৮৭. $\tan \theta = -\frac{5}{12}$ এবং $\tan \theta, \sin \theta$ একই চিহ্নযুক্ত হলে, $\sec \theta$ এর মান কত? [চ. বো. ২০২৩]

- (ক) $\frac{13}{5}$ (খ) $\frac{13}{12}$
(গ) $-\frac{13}{12}$ (ঘ) $-\frac{13}{5}$

১৮৮. $\sin A = \frac{1}{2}$ এবং $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে, $\tan(A+B)$ = কত?

- (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) 1
(গ) $\sqrt{2}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

১৮৯. $\tan \theta = 4\sqrt{3}$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান কত? [য. বো. ২০২১]

- (ক) $\frac{4\sqrt{3}}{7}$ (খ) $\frac{7}{4\sqrt{3}}$
(গ) $\frac{7\sqrt{3}}{4}$ (ঘ) $\frac{4}{7\sqrt{3}}$

১৯০. যদি $\cos \theta = \frac{b}{a}$ হয় এবং $a > b > 0$ হলে $\cot \theta$ এর মান নিচের কোনটি? [ব. বো. ২০২০]

- (ক) $\pm \frac{a}{\sqrt{a^2-b^2}}$ (খ) $\pm \frac{b}{\sqrt{a^2-b^2}}$
(গ) $\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ (ঘ) $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$

১৯১. $\sec \theta = \frac{x}{y}$ এবং $x > y > 0$ হলে $\cot \theta$ এর মান নিচের কোনটি? [চ. বো. ২০২১]

- (ক) $\frac{y}{\sqrt{x^2-y^2}}$ (খ) $\frac{x}{\sqrt{x^2-y^2}}$
(গ) $\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ (ঘ) $\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

১৯২. $\tan \theta + \sec \theta = P$ হলে, $\sin \theta$ এর মান নিচের কোনটি?

- (ক) $\frac{2p}{p^2+1}$ (খ) $\frac{p^2-1}{p^2+1}$
(গ) $\frac{p^2+1}{2p}$ (ঘ) $\frac{p^2+1}{p^2-1}$

১৯৩. $2\sin \theta = 1$ হলে $\tan \theta$ এর মান কত? [চ. বো. ২০২০]

- (ক) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ (খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
(গ) $\frac{1}{3}$ (ঘ) $\frac{1}{2}$

১৯৪. θ সূক্ষ্মকোণ এবং $\sin \theta = \frac{3}{5}$ হলে, $\cot \theta$ = কত? [দি. বো. ২০২০]

- (ক) $\frac{12}{5}$ (খ) $\frac{4}{3}$
(গ) $\frac{5}{4}$ (ঘ) $\frac{3}{4}$

১৯৫. $\cos \theta = \frac{4}{5}$ হলে $\tan \theta$ এর মান কত? [ব. বো. ২০১৯]

- (ক) $\frac{3}{5}$ (খ) $\frac{3}{4}$
(গ) $\frac{5}{4}$ (ঘ) $\frac{5}{3}$

১৯৬. $\cos \theta = \frac{4}{5}$ এবং θ সূক্ষ্মকোণ হলে, $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান কত?

- (ক) $\frac{3}{5}$ (খ) $\frac{2}{3}$
(গ) $\frac{5}{3}$ (ঘ) $\frac{5}{2}$

১৯৭. $\sin B = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos 3B - \sin 3B$ এর মান কত? [ম. বো. ২০২৩]

- (ক) -2 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 2

১৯৮. একটি সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে $\tan \theta = 5$ হলে, $\operatorname{cosec} \theta$ এর মান কোনটি? [দি. বো. ২০১৫]

- (ক) $\frac{5}{\sqrt{26}}$ (খ) $\frac{\sqrt{26}}{5}$
(গ) $\frac{1}{5}$ (ঘ) $\frac{1}{\sqrt{26}}$

১৯৯. $\tan \theta = \frac{5}{12}$ হলে, $\sec \theta$ = কত? [য. বো. ২০১৫]

- (ক) $\frac{12}{5}$ (খ) $\frac{13}{5}$

(গ) $\frac{12}{13}$ (ঘ) $\frac{13}{12}$

২০০. $\sin \theta = \frac{y}{x}$ হলে, $\tan\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$ এর মান কত? [ম. বো. ২০২০]

- (ক) $\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{y}$ (খ) $\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{x}$
(গ) $\frac{y}{\sqrt{x^2-y^2}}$ (ঘ) $\frac{x}{\sqrt{x^2-y^2}}$

২০১. $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\pi < \theta < 2\pi$ হলে $\cos \theta$ = কত?

- (ক) $\frac{12}{13}$ (খ) $\frac{5}{13}$
(গ) $-\frac{12}{13}$ (ঘ) $-\frac{5}{12}$

২০২. $\tan \theta = \frac{5}{12}$ এবং $\pi < \theta < 2\pi$ হলে $\cos \theta$ = কত?

- (ক) $\frac{12}{13}$ (খ) $\frac{5}{13}$
(গ) $-\frac{12}{13}$ (ঘ) $-\frac{5}{12}$

২০৩. $\sin \theta = \frac{4}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে $\tan \theta$ = কত? [ব. বো. ২০২৪]

- (ক) $-\frac{4}{3}$ (খ) $-\frac{3}{4}$
(গ) $\frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{4}{3}$

২০৪. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{y}{x}$ হলে $\tan\left(\frac{3\pi}{2} - \theta\right)$ এর মান কত? [ম. বো. ২০২৪]

- (ক) $\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{y}$ (খ) $\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{x}$
(গ) $\frac{y}{\sqrt{y^2-x^2}}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{y^2-x^2}}{y}$

২০৫. যদি $\pi < \theta \leq \frac{3\pi}{2}$ এবং $\tan \theta - \frac{1}{2}$ হয় তাহলে $\sin \theta$ = কত?

- (ক) $-\frac{1}{\sqrt{5}}$ (খ) $-\sqrt{5}$
(গ) $\frac{1}{\sqrt{5}}$ (ঘ) 3

২০৬. $\triangle ABC$ -এ $\sec\left(\frac{A+B}{2}\right) = ?$ [চ. বো. ২০২৪]

- (ক) $\operatorname{cosec} \frac{\pi}{2}$ (খ) $\sec \frac{\pi}{2}$
(গ) $\sec \frac{C}{2}$ (ঘ) $\operatorname{cosec} \frac{C}{2}$

২০৭. $\tan \theta = \frac{4}{3}$; যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ, তবে $\sec \theta + \cot \theta$ এর মান কত? [চ. বো. ২০২১]

- (ক) $\frac{29}{12}$ (খ) $\frac{29}{15}$
(গ) $\frac{37}{20}$ (ঘ) $\frac{27}{20}$

২০৮. $\cot \theta = -\frac{12}{5}$ এবং $\cot \theta$ ও $\operatorname{cosec} \theta$ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হলে $\sin \theta$ এর মান কত? [ম. বো. ২০২৩]

- (ক) $-\frac{5}{12}$ (খ) $-\frac{5}{13}$
(গ) $\frac{5}{13}$ (ঘ) $\frac{12}{5}$

২০৯. $\sin A$ এবং $\cos A$ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট; যেখানে $\cos A = -\frac{1}{\sqrt{3}}$, $\operatorname{cosec} A$ এর মান কত? [রা. বো. ২০২১]

- (ক) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ (খ) $-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
(গ) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ (ঘ) $\pm \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$

২১০. $\sin A = \frac{2}{\sqrt{5}}$ এবং $\sin A$ ও $\cos A$ বিপরীত চিহ্নবিশিষ্ট হলে $\tan A$ এর মান কত? [দি. বো. ২০১৭]

- (ক) -2 (খ) $-\frac{1}{2}$
(গ) $\frac{1}{2}$ (ঘ) 2

□ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১১ ও ২১২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $\cot \theta + \operatorname{cosec} \theta = P$.

২১১. $\cot \theta - \operatorname{cosec} \theta =$ কত? [য. বো. ২০২৪]

২১২. $\sec \theta$ এর মান নিচের কোনটি? [য. বো. ২০২৪]

ক) $-\frac{1}{P}$ খ) $-P$
 গ) $\frac{1}{P^2}$ ঘ) $\frac{1}{P^2}$

ক) $\frac{2P}{P^2+1}$ খ) $\frac{2P}{P^2-1}$
 গ) $\frac{P^2+1}{P^2-1}$ ঘ) $\frac{P^2-1}{P^2+1}$

□ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১৩ ও ২১৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\tan \theta = \frac{2}{3}; 0 < \theta < \frac{\pi}{2}$.

২১৩. $\sec \theta$ এর মান কত? [কু. বো. ২০২৪]

ক) $-\frac{\sqrt{13}}{3}$ খ) $-\frac{\sqrt{5}}{3}$
 গ) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ঘ) $\frac{\sqrt{13}}{3}$

২১৪. $\frac{2 \sin \theta - 3 \cos \theta}{2 \sin \theta + 3 \cos \theta} =$ কত? [কু. বো. ২০২৪]

ক) $\frac{1}{7}$ খ) $-\frac{5}{13}$
 গ) $-\frac{1}{5}$ ঘ) 0

□ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২১৫ ও ২১৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$\tan A = \frac{7}{24}$


২১৫. $\tan A$ এবং $\cos A$ একই চিহ্নযুক্ত হলে $\sin A$ এর মান কত? [দি. বো. ২০২৪]

ক) $-\frac{24}{25}$ খ) $-\frac{7}{25}$
 গ) $\frac{7}{25}$ ঘ) $\frac{24}{25}$

২১৬. $\cot A$ ও $\operatorname{cosec} A$ বিপরীত চিহ্নযুক্ত হলে $\operatorname{cosec} A$ এর মান কত? [দি. বো. ২০২৪]

ক) $\frac{25}{7}$ খ) $\frac{24}{7}$
 গ) $-\frac{24}{7}$ ঘ) $-\frac{25}{7}$

সমীকরণ থেকে θ এর মান নির্ণয়

২১৭. 

$\frac{PR}{QR} + \frac{PQ}{QR} = \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান কত? [চা. বো. ২০২৪]

ক) $\frac{\pi}{2}$ খ) $\frac{\pi}{3}$
 গ) $\frac{\pi}{4}$ ঘ) $\frac{\pi}{6}$

২১৮. $\tan \left(\frac{n\pi}{2} + \theta \right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $\theta = \frac{\pi}{3}$ হলে, n এর মান কত?

ক) $-\frac{1}{3}$ খ) $-\frac{7}{3}$
 গ) $\frac{5}{3}$ ঘ) 1

২১৯. $\cos 5\theta = \sin 5\theta$ হলে, θ এর মান কত? [সি. বো. ২০২৪]

ক) $\frac{5\pi}{4}$ খ) $\frac{\pi}{2}$
 গ) $\frac{\pi}{3}$ ঘ) $\frac{\pi}{20}$

২২০. $\cos \theta + \sin \theta = \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান কত? [কু. বো. ২০১৬]

ক) 30° খ) 45°
 গ) 60° ঘ) 90°

২২১. $\sin \theta + \cos \theta = \sqrt{2}$ হলে, θ এর মান কত? [সি. বো. ২০২২]

ক) 30° খ) 45°
 গ) 60° ঘ) 90°

২২২. $\sin B = \sqrt{2} \cos B$ হলে $B =$ কত? [দি. বো. ২০২২]

ক) $\frac{\pi}{2}$ খ) $\frac{\pi}{3}$

২২৩. $M = \sin A + \cos A$; যেখানে A সূক্ষ্মকোণ। $M = \sqrt{2}$ হলে A এর মান কত? [চা. বো. ২০২১]

ক) $\frac{\pi}{4}$ খ) $\frac{\pi}{6}$
 গ) $\frac{3\pi}{4}$ ঘ) $\frac{5\pi}{4}$

২২৪. $\tan \theta + \cot \theta = 2$ হলে, θ এর মান কোনটি? [কু. বো. ২০২২]

ক) 30° খ) 45°
 গ) 60° ঘ) 90°

২২৫. $2 \sin^2 A + 3 \sin A - 2 = 0$ হলে, $A =$ কত? যেখানে $0 < A < \frac{\pi}{2}$ [ময়. বো. ২০২২]

ক) 30° খ) 45°
 গ) 60° ঘ) 90°

২২৬. $6 \cos^2 \theta - 7 \cos \theta + 2 = 0$, যেখানে $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ θ এর মান কত? [য. বো. ২০২১]

ক) 0° খ) 30°
 গ) 60° ঘ) 90°

২২৭. $12 \sin^2 \theta - 14 \sin \theta + 4 = 0$ [$0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$] হলে, θ এর মান কত? [দি. বো. ২০১৫]

ক) 0° খ) 30°
 গ) 45° ঘ) 60°

কোণ ও সূত্র সম্পর্কিত

২২৮. ১ রেডিয়ান = কত সমকোণ? [কু. বো. ২০২১]

ক) $\frac{\pi}{4}$ খ) $\frac{\pi}{2}$
 গ) $\frac{2}{\pi}$ ঘ) $\frac{3\pi}{4}$

২২৯. বৃত্তস্থ চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের পরিমাণ কত রেডিয়ান? [দি. বো. ২০১৬]

ক) $\frac{\pi}{2}$ খ) π
 গ) $\frac{3\pi}{2}$ ঘ) 2π

২৩০. একটি P কোণের বৃত্তীয় মান Q° হলে, নিচের কোনটি সঠিক? [ব. ২০১৯]

ক) $\frac{P}{180} = \frac{Q}{\pi}$ খ) $\frac{Q}{180} = \frac{P}{\pi}$
 গ) $\frac{Q}{180} = \frac{P}{\pi}$ ঘ) $PQ = \frac{\pi}{180}$

২৩১. দুইটি কোণের সমষ্টি $\frac{\pi}{3}$ রেডিয়ান এবং অন্তর $\frac{\pi}{6}$ রেডিয়ান। বৃত্তের কোণটির বৃত্তীয় মান কত? [চা. বো. ২০১৫]


ক) $\frac{2}{3}$ খ) $\frac{\pi}{3}$
 গ) $\frac{\pi}{4}$ ঘ) $\frac{\pi}{6}$

২৩২. ABC সমকোণী সমদ্বিবাছ ত্রিভুজের $\angle B = 90^\circ$ হলে, $\angle C$ কত রেডিয়ান? [চা. বো. ২০২২]

ক) $\frac{\pi}{6}$ খ) $\frac{\pi}{4}$
 গ) $\frac{\pi}{3}$ ঘ) $\frac{\pi}{2}$

২৩৩. কোন সম্পর্কটি সত্য? [চ. বো. ২০১৫]


ক) $\sin \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \sin \frac{\pi}{6}$ খ) $\tan \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \tan \frac{\pi}{6}$
 গ) $\cos \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \cos \frac{\pi}{6}$ ঘ) $\operatorname{cosec} \left(-\frac{\pi}{6} \right) = \operatorname{cosec} \frac{\pi}{6}$

২৩৪. 

চিত্রে $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, p ও q এর সম্পর্ক কোনটি? [সি. বো. '২০১৫]

- ক) $p > q$ খ) $p < q$
গ) $p = q$ ঘ) $q = \sqrt{3}p$

□ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ২৩৫ ও ২৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৩৫. θ কোণটির বৃত্তীয় পরিমাপ কত?

[কু. বো. '২০২১]

- ক) $\frac{\pi}{6}$ খ) $\frac{\pi}{4}$
গ) $\frac{\pi}{3}$ ঘ) $\frac{2\pi}{3}$

২৩৬. $\sin \angle ROP$ এর মান কোনটি?

[কু. বো. '২০২১]


- ক) $\frac{1}{2}$ খ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
গ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঘ) 1

২৩৭. $\operatorname{cosec} A - \sin A =$ কত?

[চ. বো. '২০২১]

- ক) $\cos^2 A \cdot \operatorname{cosec} A$ খ) $\cos^2 A \cdot \sin A$
গ) $\operatorname{cosec}^2 A \cdot \cos A$ ঘ) $\operatorname{cosec}^2 A \cdot \sec A$

২৩৮.



উপরের চিত্রে $AB = AC$ হলে-

[দি. '২০১৬]

- ক) $\sin \angle ACD = \cos 55^\circ$ খ) $\sin \angle ABC = \sin 55^\circ$
গ) $\cos \angle BAC = \sin 40^\circ$ ঘ) $\sin \angle ACD = \operatorname{cosec} 55^\circ$

অনুশীলনী-৮.৩

$(-\theta)$ কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতসমূহ

২৩৯. $\sec\left(\frac{-25\pi}{6}\right)$ এর মান কোনটি?

[রা. বো. '২৫]

- ক) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ঘ) $\frac{1}{2}$

২৪০. $\tan(-1500^\circ) =$ কত?

[চ. বো. '২৫]

- ক) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ) $-\sqrt{3}$ ঘ) $\sqrt{3}$

২৪১. $\sin(-330^\circ)$ এর মান কত?

[ব. বো. '২৫]

- ক) $\frac{-\sqrt{3}}{2}$ খ) $-\frac{1}{2}$
গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

২৪২. $\tan(-570^\circ)$ এর মান কত?

[ম. বো. '২৫]

- ক) $-\sqrt{3}$ খ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$
গ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ঘ) $\sqrt{3}$

সমীকরণের সমাধান

২৪৩. $\tan(A - 90^\circ) = -\sqrt{3}$ হলে, A এর মান কত?

[রা. বো. '২৫]

- ক) 120° খ) 60°
গ) 45° ঘ) 30°

২৪৪. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, θ এর মান কত?

[রা. বো. '২৫]

- ক) $\frac{5\pi}{6}$ খ) $\frac{2\pi}{3}$

গ) $\frac{7\pi}{6}$

ঘ) $\frac{4\pi}{3}$

২৪৫. $\cot \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < 2\pi$ হলে, θ এর মান কত?

[কু. বো. '২৫]

ক) $\frac{5\pi}{6}$
গ) $\frac{5\pi}{3}$

খ) $\frac{11\pi}{6}$
ঘ) $\frac{4\pi}{3}$

২৪৬. $\cos \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\cot \theta$ এর মান কত?

[সি. বো. '২৫]

ক) $\sqrt{3}$

খ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

গ) $-\frac{1}{\sqrt{3}}$

ঘ) $-\sqrt{3}$

২৪৭. $\tan 20x = \cot 10x$ হলে, x এর মান কত ডিগ্রি?

[দি. বো. '২৫]

ক) 3°
গ) 6°

খ) 4°
ঘ) 8°

২৪৮. $\sin \theta = \frac{-3}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান নিচের কোনটি? [ম. বো. '২৫]

ক) $\frac{4}{3}$
গ) $-\frac{3}{4}$

খ) $\frac{3}{4}$
ঘ) $-\frac{4}{3}$

২৪৯. $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, θ এর মান কত?

[চা. বো. '২৫]

ক) $-\frac{\pi}{3}$
গ) $\frac{5\pi}{3}$

খ) $\frac{4\pi}{3}$
ঘ) $\frac{11\pi}{6}$

01-11 সংক্রান্ত

২৫০. $\theta = \frac{\pi}{4}$ হলে-

[চ. বো. '২৫]

- i. $\tan \theta + \operatorname{cosec}^2 \theta = 3$
ii. $\tan^2 \theta + \sec^2 \theta = 1$
iii. $\tan^2 \theta - \cot^2 \theta = 0$
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

- খ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৫১. $\sin 9A = \cos 9A$ হলে-

[ঘ. বো. '২০২৪]

- i. $\operatorname{cosec} 6A = 2$
iii. $\cot 12A = \sqrt{3}$
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

- ii. $\sec 9A = \sqrt{2}$
খ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৫২. θ এর সকল মানের জন্য-

[কু. বো. '২০২৩]

- i. $-1 \leq \sin \theta \leq 1$
iii. $-1 \leq \sec \theta \leq 1$
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

- ii. $-1 \leq \cos \theta \leq 1$
খ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৫৩. $\operatorname{cosec} \theta = -\frac{5}{3}$ এবং $\cos \theta > 0$ হলে-

[চা. বো. '২০২৩]

- i. $\tan \theta = -\frac{3}{4}$
iii. $\cot^2 \theta = \frac{16}{25}$
নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii
গ) ii ও iii

- ii. $\sec \theta = \frac{5}{4}$
খ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

২৫৪. $\cot \theta = \frac{3}{4}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$ হলে-

[দি. বো. '২০২৩]

- i. $\sec \theta = \frac{-5}{3}$

- ii. $\sin \theta + \cos \theta = \frac{-8}{3}$

$$\text{iii. cosec}\theta = \frac{-5}{4}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৫৫. \text{cosec}\theta = -\frac{5}{3} \text{ এবং } \cos\theta > 0 \text{ হলে-}$$

[সি.বো. ২০২৩]

$$\text{i. tan}\theta = \frac{3}{4}$$

$$\text{ii. sec}\theta = \frac{5}{4}$$

$$\text{iii. cot}^2\theta = \frac{16}{9}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৫৬. \text{sec}\theta = -\frac{2}{\sqrt{3}} \text{ এবং } \frac{\pi}{2} < \theta < \frac{3\pi}{2} \text{ হলে-}$$

[ঢা. বো. ২০২২]

$$\text{i. } \theta = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{ii. } \theta = \frac{5\pi}{6}$$

$$\text{iii. } \theta = \frac{7\pi}{6}$$

নিচের কোনটি সঠিক?


কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৫৭.



চিত্রে-

$$\text{i. sin}^2\theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$$

$$\text{ii. cot}\theta = \frac{2}{3}$$

$$\text{iii. cos}\theta = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৫৮. \theta \text{ এর সকল মানের জন্য-}$$

[চ. বো. ২০২২]

$$\text{i. } -1 \leq \sin\theta \leq 1$$

$$\text{ii. } -1 \leq \cos\theta \leq 1$$

$$\text{iii. } -1 \leq \sec\theta \leq 1$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৫৯. \cos A = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ এবং } \pi < A < \frac{3\pi}{2} \text{ হলে-}$$

[দি.বো. ২০২২]

$$\text{i. sin} A = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{ii. tan} A = \cot A$$

$$\text{iii. } A = \frac{5\pi}{4}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬০. \sin A = \frac{3}{5} \text{ হলে-}$$

[ময়. বো. ২০২২]

$$\text{i. sin}\theta + \cos\theta = \frac{7}{5}$$

$$\text{ii. sec}\theta + \text{cosec}\theta = \frac{30}{12}$$

$$\text{iii. tan}\theta + \cot\theta = \frac{25}{12}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬১. \theta = 2\pi \text{ হলে}$$

[দি.বো. ২০২২]

$$\text{i. tan}\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

$$\text{ii. sin}\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{iii. sec}\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = 2$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬২. \theta = \frac{3\pi}{2} \text{ হলে-}$$

[ঢা. বো. ২০১২]

$$\text{i. sec}\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 2$$

$$\text{ii. sin}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{iii. sin}\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{3}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬৩. \theta = \frac{5\pi}{2} \text{ হলে-}$$

[রা. বো. ২০২১]

$$\text{i. tan}\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{ii. sec}\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = -2$$

$$\text{iii. sin}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬৪. \tan\theta = 1 \text{ হলে-}$$

[য. বো. ২০২১]

$$\text{i. sin}^2\theta + \sec^2\theta = \frac{5}{2}$$

$$\text{ii. sin}\theta + \frac{1}{\sec\theta} = \sqrt{2}$$

$$\text{iii. sec}(-\theta) + \text{cosec}(-\theta) = 2\sqrt{2}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬৫. \theta = 45^\circ \text{ হলে-}$$

[কু. বো. ২০২১]

$$\text{i. sin}\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$$

$$\text{ii. sec}^2\theta + \cos^2\theta = \frac{5}{2}$$

$$\text{iii. cot}2\theta + \sin2\theta = 0$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬৬. \cot A = 1 \text{ হলে-}$$

[চ. বো. ২০২১]

$$\text{i. sin} A + \frac{1}{\sec A} = \sqrt{2}$$

$$\text{ii. sin}^2 A + \cot^2 A = \frac{3}{2}$$

$$\text{iii. sec}(-A) + \text{cosec}(-A) = 2\sqrt{2}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii


খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬৭. \text{পাশের চিত্র অনুসারে-}$$

[ব. বো. ২০২১]



$$\text{i. PQ}^2 = \sqrt{2}$$

$$\text{ii. sin}\theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{iii. sin}\theta + \cos\theta = \sqrt{2}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

$$২৬৮. \cos A = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ এবং } \cos A \text{ ও } \sin A \text{ একই চিহ্নবিশিষ্ট হলে-}$$

[সি. বো. ২০২১]

$$\text{i. sin} A = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{ii. cot} A = 1$$

$$\text{iii. sec} A + \tan A = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৬৯. $\tan A = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ এবং $\frac{\pi}{2} < A < \frac{3\pi}{2}$ হলে-

[দি.বো. ২০২১]

i. $A = \frac{5\pi}{6}$

ii. $\sin^2 A = \frac{1}{4}$

iii. $\cos A = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭০. θ এর যে কোনো মানের জন্য-

[ময়. বো. ২০২১]

i. $-1 \leq \cos \theta \leq 1$

ii. $|\tan \theta| \geq 1$

iii. $|\sin \theta| \leq 1$

নিচের কোনটি সঠিক?


কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭১.



ওপরের চিত্রের জন্য-

[চা. বো. ২০২০]

i. $AB^2 = 5$ একক

ii. $2\cos \theta + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$

iii. $\sin \theta + 2\cos^2 \theta = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭২. $\theta = \frac{3\pi}{2}$ হলে-

[য. বো. ২০২০]

i. $\cot\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) = -\sqrt{3}$

ii. $\sin\left(\theta - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

iii. $\operatorname{cosec}\left(\theta - \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৩. $\tan \theta = -\sqrt{3}; \frac{\pi}{2} < \theta < 2\pi$ হলে θ এর মান-

[চ. বো. ২০২০]

i. $\frac{2\pi}{3}$

ii. $\frac{5\pi}{3}$

iii. $\frac{3\pi}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?


কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৪.



চিত্রে-

[সি. বো. ২০২০]

i. AC এর মান 5 একক

ii. ΔABC এর ক্ষেত্রফল 6 বর্গ একক

iii. θ এর মান 60°

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৫. θ এর যেকোনো মানের জন্য-

[ময়. বো. ২০২০]

i. $\sin 3\theta = 3\sin \theta - 4\sin^3 \theta$

ii. $\cos 2\theta = 2\cos^2 \theta - 1$

iii. $\cos 3\theta = 3\cos \theta - 4\cos^3 \theta$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৬. $\cos \theta = \frac{1}{2}, \frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ হলে-

[দা. বো. ২০২০]

i. $\tan \theta = \sqrt{3}$

ii. $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

iii. $\sec \theta = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৭. $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং $0 < A < 2\pi$ হলে-

[চা. বো. ২০১৯]

i. $A = \frac{\pi}{3}$

ii. $A = \frac{2\pi}{3}$

iii. $A = \frac{4\pi}{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৮. $\sec \theta = 2, \frac{3\pi}{2} < \theta < 2\pi$ হলে

[চ. বো. ২০২২]

i. $\tan \theta = -\sqrt{3}$

ii. $\sin \theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

iii. $\cos \theta = \frac{1}{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?


কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৭৯.



চিত্রে-

[ব. বো. ২০১৯]

i. $\angle DOC$ ত্রিভুজে $CD = x$

ii. $AB = 2x$

iii. $\theta = \frac{\pi}{4}$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৮০. $\tan \theta = 1$ হলে-

[সি. বো. ২০১৯]

i. $\sin^2 \theta + \cot^2 \theta = \frac{3}{2}$

ii. $\sin \theta + \frac{1}{\sec \theta} = \sqrt{2}$

iii. $\sec(-\theta) + \operatorname{cosec}(-\theta) = 2\sqrt{2}$

নিচের কোনটি সঠিক?

কি ও ii

খি ও iii

গি ও iii

ঘি, ii ও iii

২৮১. যদি $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হয়, তবে-

[চা. বো. ২০১৭]

i. $\sec^2 \theta = 2$

ii. $\sin^2 \theta = \frac{1}{2}$

iii. $\tan^2 \theta = 1$


নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii
গিি ও iii

২৮২. চিত্র হতে-

- খি ও iii
খি, ii ও iii

[য. বো. ২০১৭]



i. $\tan \theta = \frac{4}{3}$ ii. $\cos \theta = \frac{3}{5}$

iii. $\sin^2 \theta = \frac{16}{25}$
নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৮৩. $\theta = 60^\circ$ হলে-

[রা.বো.২০১৬]

i. $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$
ii. $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$
iii. $\sec^2 \theta - \tan \theta = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৮৪. নিচের কোনটি সঠিক?

[য. বো. ২০১৬]

- i. পরিধি = $\pi \times$ ব্যাসার্ধ
ii. রেডিয়ান কোণ একটি ধ্রুবক কোণ
iii. রেডিয়ানকে 1^R দ্বারা প্রকাশ করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৮৫. $\sin^2 \theta - \cos^2 \theta = \cos \theta$ (যেখানে $0^\circ \leq \theta \leq \pi$) হলে-

i. $\theta = \pi$ ii. $\theta = \frac{\pi}{3}$

iii. $\theta = \frac{2\pi}{3}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৮৬. যদি $\cos \theta = \frac{b}{a}$ হয় এবং $a > b > 0$ হলে-

[ব. বো. ২০১৬]


i. $\sin \theta = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$ ii. $\cot \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

iii. $\cos \theta - \sec \theta = \frac{a^2 - b^2}{ab}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৮৭.



চিত্রে $\sin \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ এবং O বৃত্তের কেন্দ্র হলে-

[সি. বো. ২০১৬]

- i. বৃত্তের পরিধি 2π ii. বৃত্তের ক্ষেত্রফল π
iii. θ এর মান $\frac{\pi}{6}$
নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii
গিi ও iii

- খি ও iii
খি, ii ও iii

২৮৮. $\theta = 360^\circ$ হলে-

[সি. বো. ২০১৬]

i. $\cos \left(\theta - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ii. $\cot \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) = \sqrt{3}$

iii. $\tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৮৯. প্রচলিত অর্থে-

[দি. বো. ২০১৫]

- i. π একটি অমূলদ সংখ্যা
iii. π একটি ইংরেজি বর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৯০. $\sin \theta = \frac{b}{a}$ (যেখানে $a > b > 0$) হলে-

[কু. বো. ২০১৫]

i. $\tan \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

ii. $\cot \theta = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b}$

iii. $\sec \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৯১. θ সূক্ষ্মকোণ হলে-

[চ. বো. ২০১৫]

i. $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ii. $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$

iii. $\operatorname{cosec}^2 \theta + \cot^2 \theta = 1$

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

২৯২. $\sin \theta + \cos \theta = 1$ হলে, θ এর মান-

[সি. বো. ২০১৫]

[ব. বো. ২০১৬]

ii. 30°


iii. 90°

নিচের কোনটি সঠিক?

- কি ও ii খি ও iii
গিi ও iii খি, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নোত্তর

□ নিচের তথ্যের আলোকে ২৯৩ ও ২৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



২৯৩. যদি $MN = 1$ এবং $LM = \sqrt{3}$ হয়, তবে $\cos(-\theta) + \tan(-\theta) = ?$ [দি. বো. '২৫]

কি $\frac{\sqrt{3}}{6}$ খি $\frac{5\sqrt{3}}{6}$

গি $\frac{2\sqrt{3}-1}{2}$ ঘি $\sqrt{3} - 1$

২৯৪. $\frac{l}{\sqrt{l^2 + n^2}} + \frac{n}{\sqrt{l^2 + n^2}} = \sqrt{2}$ সমীকরণের সমাধান নিচের কোনটি?

[দি. বো. '২৫]

- কি $\frac{\pi}{2}$ খি $\frac{\pi}{3}$
গি $\frac{\pi}{4}$ ঘি $\frac{\pi}{6}$